


H Chinese
Vol IV

4
V. 8 - V. 10



唐王壽先生外臺秘要方卷八目錄痰飲胃反噎等三十門

痰飲說二首

懸飲方二首

支飲方九首

酒澼飲方三首

痰澼方二首

癖飲方七首

痰結實及宿食方三首

痰厥頭痛方八首

療諸痰飲方四首

脾胃弱不能食方三首

胃實熱方二首

五膈方八首

氣噎方六首

卒食噎方九首

諸骨哽方三十五首

痰飲食不消及嘔逆不下食方九首

溢飲方三首

留飲方二首

留飲宿食方七首

飲癖方二首

冷痰方四首

胸中痰澼方三首

風痰方五首

胃反方二十首

脾胃病日漸瘦困不食方三首

胃虛寒方七首

七氣方三首

諸噎方一十二首

五噎方三首

雜誤吞物方一十七首

尚德按今有方一十七首

尚德按今有方六首

尚德按今有方三十四首

唐王焘先生外臺秘要方卷八

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

痰飲論二首

尚德按肺病源作府

又按飲病源作痰

病源痰飲者由氣脈閉塞津液不通水飲氣停在胸膈結而成痰又其人素盛今瘦水走腸間漉漉有聲謂之痰飲其為病也胸脅脹滿水穀不消結在腹內兩肋水入腸胃動作有聲身體重多唾短氣好眠胃背痛甚則上氣欬逆倚息短氣不得卧其形如腫是也脈偏弦為飲浮而滑為飲其湯熨針石別有正方補養宣導令附子後養生方導引法云左右側卧不息十二通療痰飲不消右有飲病右側卧左有飲病左側卧又有不消氣排之左右各十二息療痰飲

卷第二

千金痰飲論問曰夫飲有四何謂師曰有痰飲

云有懸飲

有溢飲有支飲問曰四飲之證何以為異師

曰其人素盛今瘦水走腸間漉漉有聲謂之痰飲飲後水留在脅下欬唾引痛謂之懸飲飲水過多歸於四肢當汗出而不汗出身體疼痛重謂之溢飲其人欬逆倚息短氣不得卧其形如腫謂之支飲凡心下有水者築築而悸短氣而恐其人眩而顛先寒即為虛先熱即為實故水在於心其人心下堅築築短氣惡水而不欲飲水在於肺其人吐涎沫欲飲水水在於脾其人少氣身體盡重水在於肝脅下支滿噎而痛水在於腎心下悸夫病人卒飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脈弦者寒也皆大下後喜虛耳脈偏弦者飲也肺飲不弦但喜喘短氣支飲亦喘而不能眠加短氣其脈平也留飲形不發作無熱脈微煩滿不能飲食脈沉滑者留飲病有留飲者脅下痛引缺盤欬嗽轉甚

云其人已云其人

尚德按金下同

人背寒冷大如手病人胃息上引此皆有溢飲在胃中久者缺盤滿馬刀腫有劇時此為氣飲所致也膈

上之病滿喘欬吐發則寒熱背痛惡寒目泣出其人振振身瞤劇必有伏飲病人一臂不隨時復轉移在

飲食不消及嘔逆不下食方九首

一臂其脈沉細此非風也必有飲在上焦其脈虛者為微勞榮衛氣不周故也出第十八卷中通按形

痰飲食不消及嘔逆不下食方九首

病源夫痰水結聚在於胃脘膀胱之間久而不散流行於脾胃脾胃惡濕得水則脹脹則不能消食也或

令腹裏虛滿或水穀不消化或時嘔逆皆其候也出第二卷中

廣濟療心頭痰積宿水嘔逆不下食前胡丸方 前胡 白朮 甘草各五錢旋覆花 豆蔻仁各三人參

麥門冬六分枳實各一分大黃各四分 右九味搗篩蜜和為丸如梧子大空肚以酒下二十九粒漸加至三

十九日再服不利忌桃李雀肉海藻松菜麤炙肉魚蒜粘食生冷等物

又療心胃中痰積氣噎嘔逆食不下方 柴胡 橘皮各六分茯苓八分 麥門冬去心雞蘇各八分生薑十二

分 檳榔仁四分末 右八味切以水八升煮取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行七八里

進一服未差三日更服一劑以利為度忌酢物生冷油膩粘食並出一

千金瘧疾飲飲食不消乾嘔湯方 澤瀉 杏仁去尖枳實各一分白朮各三分茯苓 柴胡 生薑 芍藥各

兩 旋覆花 人參 橘皮 細辛各二分半夏四分 右十三味切以水九升煮取二升七合分為三服

忌桃李雀肉大酢生菜羊肉錫等物

又瘧瘧中痰飲腹中水鳴食不消嘔吐水湯方 大腹積榔四十生薑八兩半夏半升杏仁四兩橘皮三

茯苓五兩白朮四兩 右七味切以水一斗煮取三升去滓分三服忌羊肉錫大酢桃李雀肉等古今錄

范汪薑椒湯主胃中積聚痰飲飲食減少胃氣不足效逆吐哕方 半夏三兩生薑汁七桂心 附子炮

甘草炙茯苓 桔梗各一兩蜀椒二合橘皮二兩 右九味切以水七升煮取二升半去滓內薑汁煎取

四升半分三服服三劑佳若欲服大散并諸五石丸必先服此方及進黃耆丸輩必佳忌海藻松菜羊

肉錫生葱猪肉冷水酢物千金翼

尚德按千金三兩作二兩四兩作三兩二兩作一兩 尚德按千金積柳十枚生薑二兩半夏八兩 尚德按者取二升半內薑汁七合煎取四升半可服千金及翼

又白朮茯苓湯主胃中結痰飲潴結臍下弦滿嘔逆不得食亦主風水方 白朮五兩茯苓三兩橘皮當歸

附子二兩生薑半斤桂四兩細辛四兩右九味切以水一斗煮取三升分三服服三劑良忌

羊肉錫桃李雀肉猪肉冷水生葱生菜醋物等千金翼同

又旋覆花湯主胸膈痰結唾如膠不下食者方 烏頭五枚旋覆花細辛前胡甘草茯苓各

兩半夏一兩生薑八兩桂心四兩右九味切以水九升煮取三升分三服忌羊肉錫海藻松菜生葱酢

物猪肉冷水等並出第十卷中

延年茯苓飲主心胸中有停痰宿水自吐水出後心胸間虛氣滿不能食消痰氣令能食方 茯苓三人

參二兩白朮三兩生薑四兩枳實二兩橘皮半斤右六味切以水六升煮取一升八合去滓分溫三服如人

行八九里進之忌酢物桃李雀肉等仲景傷寒論同

古今錄驗療胸膈痰飲食噎經日則併吐出食皆不消出如初空腹一兩日聚食還復吐之極不便此由

痰飲聚下絕不通服此丸宣通下氣方 吳茱萸澤瀉芍藥白朮漢防己赤茯苓各二兩蜀大

黃二兩右七味搗篩蜜和為丸如梧子大飲服二十五丸忌桃李雀肉酢物出第十卷中

懸飲方二首

病源懸飲謂飲水過多留在脅下令脅間懸痛致唾引脅痛故云懸飲出第二十卷中

范汪大甘遂丸療久潴留水潴飲方 芫花蒸甘遂羊脂子熟大黃苦參大戟芒硝貝母

桂心各一兩杏仁三十枚巴豆三十枚去心皮烏喙三分炮右十二味搗篩其巴豆杏仁搗如膏合以蜜和丸

如大豆許服二丸日三服不知稍加以意將息之大佳瘡大水飲病忌食蘆葦豬肉生葱等出第十卷中

千金療懸飲十棗湯方 芫花甘遂大戟右三味等分搗篩以水一升五合煮大棗十枚取八合

絞去滓內藥末強人取一錢匕贏人半錢匕頓服之平旦不下者益藥半錢下後以糜粥自養此本仲景傷寒

論方出第十八卷中尚德按千金云平旦服而不下者明旦更加藥半錢要畧同

通接溢飲
當汗出而
不汗出身
體如腫今
云多汗不
卜何故
尚德接傷
寒論大寒
十二枚
又接傷寒
論二升下
有去上沫
三字遂虛
作遂虛
尚德接子
金云小青
龍湯不云
又接子金
二升下有
去上沫三
字者字下
有取字傷
寒論同

溢飲方三首

病源溢飲謂因大渴而暴飲水水氣溢於腸胃之外在於皮膚之間故言溢飲令人身體疼重而多汗是其候也出第十二卷中

范汪溢飲者當發其汗大青龍湯主之方 麻黃六兩桂心二兩甘草炙二兩生薑兩三石膏如雞子杏仁四枚

皮大棗十枚右七味以水九升先煮麻黃減二升乃內諸藥煮取三升絞去滓適寒溫服一升溫

覆令汗汗出多者溫粉粉之一服汗出者勿復服汗出多亡陽逆虛惡風煩躁不得眠服微弱汗出惡

風不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也忌海藻松菜生葱此本仲景傷寒論方出第十六卷中

千金溢飲者當發其汗宜青龍湯方 麻黃節去藥細辛 桂心 乾薑 甘草炙各兩五味子 半夏

各半 右八味切以水一斗先煮麻黃減二升乃內餘藥煮三升去滓溫服一升忌海藻松菜羊肉鴿

生菜生葱此仲景傷寒論小青龙湯也出第十八卷中

千金翼大五飲丸主五種飲一曰留飲停水在心下二曰澀飲水澀在兩脅下三曰痰飲水在胃中四曰

溢飲水溢在膈上五藏間五曰流飲水在腸間動搖有聲夫五飲者由飲後傷寒飲冷水過多所致方

遠志去心苦參 烏鰂魚骨 藜蘆 白朮 甘遂 五味子 大黃 石膏 桔梗 半夏洗紫苑

前胡 芒硝 栝蒌 桂心 茯苓 貝母 芫花 當歸 人參 茯苓 芍藥 大戟 草薢

黃芩各一兩常山 甘草炙山藥 厚朴 細辛各三分附子炮三分巴豆去心右三十三味搗篩蜜和

為丸如梧子大酒服三九日三稍加之忌狸肉桃李雀肉猪肉羊肉鰾生葱酢物生菜野猪肉蘆葦等

胡洽同出第九卷中

支飲方九首

病源支飲謂水飲停於脅膈之間支乘於心故云支飲其病令人欬逆喘息身體如腫之狀謂之支飲

尚德按要一升分煮取再服無文以以下文尚德按湯分兩服法與此異外臺蓋採要尚德按千金無加使金以下六字要略同且出小半夏湯方又換二斗千金作一斗斤要略同尚德按仲景白飲服飲水不厚朴大黃湯主之方厚朴一兩大黃六兩枳實四兩

深師療心下有支飲其人喜眩一作苦澤瀉湯方 白朮二兩澤瀉五兩 右二味切以水二升煮取一升又以

水一升煮取五合此二汁分為再服忌桃李雀肉等此本仲景傷寒論方

千金瘰癧支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯方 葶藶子熱令紫色搗為丸如彈丸大大棗十二枚 右二味先以水三升煮

大棗得汁二升內葶藶煎取一升頓服三日一劑可服三四劑此本仲景傷寒論方

又嘔家不渴為欲解本渴今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之加茯苓者是也先渴却嘔此為水

停心下小半夏加茯苓湯主之卒嘔吐心下痞膈間有水目眩悸小半夏加茯苓湯方 半夏半升生薑半斤

茯苓四兩 右三味切以水七升煮取一升五合分再服忌羊肉鵠大醋仲景湯寒論後茯苓三兩餘並同尚德按渴字下千金更有渴字

又假令瘦人膈下有停者吐涎沫而顛眩水也五苓散主之方 豬苓去白朮各三分桂心二分澤

瀉五分 右五味下篩水服方寸匕日三多飲水汗出愈忌桃李雀肉生葱醋物等此本仲景傷寒論方

又心下有痰飲胸脇支滿目眩甘草湯主之方 甘草二兩桂心 白朮各三分茯苓四兩 右四味細切以

水六升煮取三升去滓服一升日三小便當利忌海藻松菜生蔥桃李醋物等此本仲景傷寒論方

又夫酒客飲者必致吐血此坐以極飲過多所致也其脈虛者必胃其人本有支飲在胸中也支飲胸滿

厚朴大黃湯主之方 厚朴一兩大黃六兩枳實四兩 右三味細切以水五升煮取二升去滓溫分再服

之此本仲景傷寒論方

又夫上氣汗出而欬者此為飲也乾薑湯主之若下後不可與也乾薑湯主腫及支滿潏飲方 大黃

大戟各一兩芫花炒芫花各半兩甘草炙甘遂 黃芩各一兩乾薑十枚 右八味切以水五升煮取一升六合

分四服空心服以快下為佳忌海藻松菜

又膈間支飲其人喘滿心下痞堅面黃黑其脈沉緊得之數十日醫吐下之不愈木防己湯主之方

木防己三兩石膏三兩桂心二兩人參四兩 右四味以水四升煮取二升去滓分再服虛者即愈實者

三日復發則復與不愈者宜去石膏加茯苓芒硝湯方 木防己三兩桂心二兩人參 茯苓各四兩芒硝三

三兩

支飲方九首 留飲方二首

發字下更
有發字與
字下有若

尚德按去
目字下疑脫

尚德按十
金十二枚

下云水三
升煮取一

升煮取一
升煮取一

亦同升半
作一升半

要略右四
味下云以

水二升煮
取半升去

滓云云
又按芍藥

千金二枚
要略五枚

酒淋飲方三首

右五味以水六升煮四味取二升去滓內芒硝分溫再服取微下利則愈忘生葱此本仲景傷寒論方

留飲方二首

病源留飲者由飲酒後飲水多水氣停留於胸膈之間而不宣散乃令人脇下痛短氣而渴皆其候也出

卷中十

范汪海藻丸療腹中留飲方 海藻 木防己 甘遂 從蓉 蜀椒汗芫花熬葶藶子熬各右七味

搗篩蜜和為丸如梧子服十九丸不差當增之出第十卷中

千金療病者脈伏其人欲自痢痢者反快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故也甘遂半夏湯主之方

甘遂大者半夏十二分芍藥兩甘草如指大 右四味以蜜半升內藥汁及蜜合一升煎取八大合頓服

之忌海藻乾菜羊肉餲此本仲景傷寒論

酒淋飲方三首

病源夫酒淋者因大飲酒後渴而引飲無度酒與飲俱不散停滯在於脇肋下結聚成癖時時而痛因却

呼為酒癖其狀脇下位急而痛出第二十卷中

深師消飲丸療酒癖飲酒停痰水不消滿逆嘔吐目視眈眈耳聾腹中水聲方 乾薑 茯苓各三白木

枳實四枚

右四味搗篩蜜和丸服如梧子五九日三稍加之若下去枳實加乾薑二兩名為五飲

丸忌桃李雀肉大醋生冷之類大神驗

又倍朮丸療五飲酒癖方 白朮斤桂心 乾薑各半 右三味搗篩蜜和丸如梧子飲服十九稍加之

取下先食服之日再忌桃李雀肉生葱

又溫脾丸療久寒宿食酒癖方 乾薑三兩芍藥三兩蜀椒汗二兩 小草一兩芎藭 茯苓 桃仁去皮藥胡

三熟各大黃八兩切熬 右九味搗篩蜜和更搗萬杵服如大豆許十九日三忌大醋並出第十二卷中

留飲宿食方七首

病源留飲宿食者由飲酒宿食後飲水多水氣停留於脾胃之間脾得濕氣則不能消食令人噎氣酸臭腹脹滿亦壯熱或吞酸所以謂之留飲宿食也出第二卷中

深師通草丸療積聚留飲宿食寒熱煩結長肌膚補不足方 椒目 附子 炮半夏 洗厚朴 炙芒硝 五

大黃九兩 厚朴三兩 杏仁三兩 去 右八味搗篩末別搗芒硝杏仁令如膏合諸末以蜜和丸搗五千

杵服如梧子二丸忌豬肉羊肉鵠等大散 方中無通草未詳其

范汪千金丸療心腹留飲宿食方 沙參 丹麥 苦參 桂心各二分 石膏五分 人參 大黃各半 夏

乾薑各五分 戎鹽一分 巴豆六十枚 附子一分 右十二味皆搗合以白蜜和如小豆吞一丸日再令人

先食服一丸不知稍益以知為度忌豬肉冷水羊肉鵠蘆葦生葱

又療留飲宿食桑耳丸方 桑耳二兩 巴豆一兩 右二味搗和以棗膏丸如麻子先食服一丸不下服二

丸病下即止忌野豬肉蘆葦

又主留飲宿食先施丸方 先施一兩 大黃 甘遂 黃連 麻黃各去心 杏仁去皮 甘草炙 附子炮 各巴

豆五十枚 右九味搗篩杏仁巴豆別搗如膏合和以蜜丸如小豆先食服一丸日再不知稍增以知

為度忌海藻松菜猪肉冷水蘆葦等

又順流紫丸療百病留飲宿食心下伏痛四肢煩疲男子五勞七傷婦人產有餘疾等方 當歸 代類

各一 茯苓 烏鰂魚骨 桂心各三分 肉苁蓉二分 蘆薈五分 巴豆六十枚 右八味搗篩白蜜和丸先食

服如小豆一丸日再不知增之欲下倍服之別搗巴豆令如膏忌生葱狸肉酢物野豬肉蘆葦並出第

千金療留飲宿食不消腹中積聚轉下當歸湯方 當歸 人參 桂心 甘草炙 芒硝 芍藥各二兩 大

黃四兩 生薑 黃芩 澤瀉各三兩 右十味切以水一斗煮取三升分三服空心食後服忌生葱海藻松

菜出第十卷中

尚德按全字下疑脫折字

尚德按千金黃芩二兩

尚德按飲
疑當作群

集驗痰飲積聚嘔逆東風虛勞陰虛方 霜後蒺藜苗子搗汁一石先以武火煎減半即以文火煎攪勿
停手候可丸止空腹酒下梧子大三十九丸煎服亦得出卷五

痰飲方二首

病源痰癖者由飲水未散在於胸膈之間因遇寒熱之氣相搏沉滯而成痰也痰之停聚流移於脇肋之
間有時而痛則謂之痰癖出卷二

延年療左肋下停痰癖飲結在兩脇脹滿羸瘦不能食食不消化喜唾乾嘔大便或澀或利或赤或黃腹
中有時水聲腹內熱口乾好飲水漿卒起頭眩欲倒脇下痛旋覆花丸方 旋覆花分大黃分 茯苓分

澤瀉分 人參 桂心 皂莢去皮 附子各二枚 芍藥四兩 蜀椒三分 干姜一分 乾地黄四兩 防葵分 乾薑 枳
實分 杏仁去皮 葶藶子分 右十六味搗篩為末內杏仁葶藶脂中碎研調篩度蜜和為丸每食後

少時白飲服三丸如梧子日二服稍增以微利為度禁食諸肉魚翅蒜生蔥酢今既在肋下有癖氣水
飲結聚不散數發則悶刺心痛又未曾服如此破癖飲藥雖服補藥癖氣不除終是不損思久積聚更

急飲食減少此方正與癖氣相當更有三種毒藥今商量除訖其方內有附子及別本續命丸有烏
頭此並破癖疾不得不用復聽臨時不如服烏頭丸癖氣得減亦未必須服旋覆花丸忌酢物生葱薑

肉蕪荑出第十卷中

集驗瘧瘕癖心腹痛兼冷方 薤白分 柴胡 赤芍藥分 八甘魚分 枳實分 生薑 白朮各六分 續命丸

右八味切以水六升煮七味取二升半去滓內續命丸分服八合當利忌海藻菰菜苽菜桃李雀肉等

飲癖方二首

病源飲癖者由飲水過多在於脇下不散又遇冷氣相觸而痛呼為飲癖也其狀脇下逆急時有水聲

二十

海師附子湯瘧氣分心下堅如盤邊如旋杯水飲所作此湯主之方 桂心 生薑 麻黃去節各三兩 甘草

簡急燈心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作枳實白朮湯方
枳實炙白朮兩右二味切以水一斗

辯飲方七首

病源此由飲水多水氣停聚兩脇之間遇寒氣相搏則結聚而成塊謂之癖飲在於兩脇下弦且起按之作水聲也

下支滿飲輒引脇下痛方 甘遂 芫花各一大戟三 右三味為散以大棗十二枚擘破以水六升先

前藥取二升內藥三方寸匕更煎取一升此即前藥方兩服法與此不同合分再服以吐下為知未重服甚良無比卷中通按

千金中候黑丸瘰癧飲停結悶滿目醫方
巴豆皮心故 芫花蘇 桂心 桂枝各 杏仁皮共
五味搗師蜜和丸飲服如胡旦三丸日一稍增得快下為度忌豬肉蘆筍生葱等射後

千金半夏湯療痰冷癖飲胸膈中不埋方
白朮兩半夏洗三升薑兩茯苓兩人參桂心甘草附子
各兩右八味切以水八升煮取三升絞去滓分溫三服忌羊肉鵲巢肉大酢生葱海藻松菜

豬內冷水
人破覆花丸
症停痰癖
飲結在兩
脇腹脹滿
臌瘦不能
食食不消
化喜唾乾
嘔大小便
或澀或刺
等在腸

胃動搖作水聲石旋覆花杜心枳實人參分乾薑白朮分茯苓牡蠣海魚

分十餘作
五兩

尚德按肘
後脫作肘
三百粒作
三兩
尚德按肘
後脫作肘
有冷字用
水八升

乾薑石^各八分細辛 大黃 黃芩 芒硝^各子 厚朴^各是光花 吳茱萸 橘皮^各四分 甘遂^各三分 右二十
味搗篩蜜和丸酒服如梧子五丸日再服加之以知為度忌桃李雀肉大酢猪肉生菜生薑水大驗^出

第十八

千金翼前胡湯主胸中久寒癖實宿痰胸膈不通利三焦冷熱不調飲食損少無味或寒熱體重卧
不欲起方 前胡^各生薑^各黃芩^各一人參^各二吳茱萸^各兩大黃^各兩防風^各兩杏仁^各三十粒當歸 甘草^各兩二半

夏^三兩麥門冬^各一兩 右十二味切以水一斗煮取三升去滓分溫三服日三服三劑良深師云若脇

下滿加大棗二枚利水亦佳忌海藻松菜羊肉錫等

又半夏湯主痰飲癖氣吞酸方 半夏^各三兩生薑^各六兩附子^各一枚吳茱萸^各三兩粒炒 右四味切以水五升煮

取二升半去滓分溫三服老小服半合日三忌猪羊肉錫

又薑附湯主痰辟氣方 生薑^各八兩附子^各四枚 右二味水五升煮取二升分再服亦主卒風大良忌猪肉

冷水^各深師^各出^各中

冷投方四首

病源冷痰者言胃氣虛弱不能宣行水穀故使痰水結聚停於胸膈之間遂令人吞酸氣逆四肢變青不

能食飲^各出^各中

范汪病痰飲者當以溫藥和之按心腹虛冷逆痰氣上胸脇滿不下食嘔逆胸中冷半夏湯方 半夏^各升

洗生薑^各斤橘皮^各兩 右三味切以水一斗煮取三升分三服若心中急及心痛內桂枝四兩若腹痛內

當歸四兩麻瘦老小者服之佳忌羊肉錫

又方 半夏^各湯^各升生薑^各斤桂心^各三升甘草^各三兩 右四味切以水七升煮取二升半分三服忌海藻松菜羊

肉錫生薑^各出^各中

千金翼苓湯主胸膈痰滿方 茯苓^各兩半夏^各一升生薑^各斤桂心^各兩 右四味切以水八升煮取二升半分

尚德按肺
病源作肺

尚德按二
十枝千金
作二十七枝

尚德按肺
後無水字
千金同
尚德按千
金名斷肺

四服令極者加大附子四兩氣滿者加積柳三七枚忌酢物羊肉生葱錫出第十卷中

千金翼論曰凡痰飲或吐水無時節其源為飲飲過度遂令膈冷脾胃氣羸不能消於食飲食飲入胃皆變成冷水反吐不停者赤石脂散主之方 赤石脂三斤 右一味搗下篩服方寸匕日三酒飲並可稍稍

加至三匕服盡三斤則終身不吐水又不下利補五藏令肥健有人久患痰飲諸藥不差惟服此一斤則愈出第十卷中

痰結實及宿食方三首

病源此由痰水積聚在於胸膈遇冷熱之氣相搏結實不消故令人心腹痞滿氣急不安頭眩目暗常欲嘔逆故言痰結實出第十卷中

集驗療宿食結實及痰癖瘕瘕方 瓜蒂一斤 赤小豆四兩 右二味搗篩溫湯三合以散一錢匕投

湯中和服之須臾當吐不吐更服半錢湯三合令吐如吐不止飲冷水出第十卷中 千金公羅湯主胸中痰積熱昏除之方 松蘿二斤 烏梅 梔子各二斤 常山三斤 甘草一斤 右五味切以酒

三升漬一宿平旦合水三升煮取二升半去滓頓服之亦可再服得快吐止忌海藻松蘿生葱菜又療腦散療心上結痰實寒冷心悶方 瓜丁二十枚 赤小豆二十枚 人參 甘草一分 右四味搗為散酒服方寸匕日二亦療諸黃忌海藻松蘿出第十卷中

胸中痰癖方三首

肘後療胸中多痰頭痛不欲食及飲酒則痰阻痰方 礬石一斤 右一味以水二升煮取一升內蜜半合頓服之須臾未吐飲少熱湯

又方 桂一斤 三朮三斤 松蘿三斤 右三味切以水酒一升二合漬之再宿去滓溫分再服一服不吐暖更一服出第十卷中

千金治腦為主胸中痰癖方 常山三斤 甘草 松蘿各一斤 瓜蒂二斤 右四味酒水各二升半煮取一升

滿
又按千金
二十七枚
二升半
二升半
作

尚德按十
全通吐作
摘吐而
作而渴

半初服七合取吐吐不盡餘更分二服得快吐在後須服半夏湯在前冷痰部中忌海藻松菜生葱生

痰厥頭痛方八首

病源謂痰水在於胸膈之上又犯大寒使陽氣不行令痰水結聚不散而陰氣逆上上與風痰相結上衝

於頭即令頭痛或數歲不已久連膈痛故云膈痰厥厥頭痛若手足寒冷至節則死出卷中

千金療卒頭痛如破非中冷又非中風其病是胸膈中痰厥氣上衝所致名為厥頭痛吐之則差方但

單煮若作飲二三升許適令暖飲三升須臾適吐適吐畢又飲能如此數過劇者須吐膽汁乃止不損

人渴而則差卷中 千金翼葱白湯至冷熱膈痰發時頭痛悶亂欲吐不得方 葱白二分 烏頭二分 甘草二分 真珠二分 常

山紅桃葉肥 右六味切以酒四升水四升合煮取三升去滓內真珠服一升得吐止忌海藻松菜猪

肉冷水生葱生菜生血等物同 又療痰飲頭痛往來寒熱方 常山一兩 雲母粉 右二味為散熱湯服方寸匕吐之止若吐不盡更服

忘生葱生菜同 師云別雲母兩條之 備急葛氏主卒頭痛如破非中冷又非中風是胸膈中痰厥氣上衝所致名厥頭痛吐即差療方 釜下

墨附子 三分 右二味搗散以冷水服方寸匕當吐愈一方有桂心一分忌猪肉冷水後同

又方 以鹽湯吐不吐擗出同 又方 苦參 桂心 半夏洗 右三味等分為末苦酒和以塗痛上則差忌生葱羊肉後同

又方 常山四分 甘草半兩 右二味切以水七升煮取三升服一升不吐更服亦可內蜜半升忌生葱生菜

海藻松菜 同 又方 烏梅三十 鹽三指 右二味以酒三升煮取一升一服當吐愈同

又方 烏梅三十 鹽三指 右二味以酒三升煮取一升一服當吐愈同

又方 烏梅三十 鹽三指 右二味以酒三升煮取一升一服當吐愈同

又方 烏梅三十 鹽三指 右二味以酒三升煮取一升一服當吐愈同

風痰方五首

延年白朮丸主除風痰積聚胃中冷氣每發動令人嘔吐食或吐清水食飲減少不作肌膚方 白朮五分

白芷三分乾薑 石斛各六分五味子 細辛 橘皮 厚朴炙桂心 防風 茯苓 甘草各四分 右十

二味搗篩蜜和丸如梧桐子服十丸飲下日二加至二十九忌桃李雀肉生蔥海藻松菜生菜酢物方

有人參五分十
三味藥亦堪處

又茯苓湯主風痰氣發即嘔吐欠味煩悶不安或吐痰水者方 茯苓三人參 生薑 橘皮 白朮各

兩 右五味切以水五升煮取一升五合去滓溫分三服中間任食忌大醋桃李雀肉等出第十

又木蘭湯主熱痰飲氣兩肋滿痛不能食者方 木蘭 枳實炙黃芩 白朮各三分漏蘆根 白斂 升

麻 芍藥 桔梗各二生薑 大黃兩四分 右十一味以水八升煮取二升六合分爲三服如人行三

四里進一服忌桃李猪肉雀肉參三方有元

又茯苓飲主風痰氣吐嘔水者方 枳實兩一分茯苓 白朮 人參各二分生薑兩四分橘皮一分 右六味切

以水五升煮取一升半分三服中間任食忌桃李雀肉大醋張文仲處並出第六卷中

又療風痰飲氣逆滿惡心不能食方 人參兩二分枳實炙白朮各三分生薑兩四分桂心一分 右五味切以水五

升煮取一升五合分溫三服忌桃李雀肉生蔥張文仲處出第十七卷中

療諸痰飲方四首

廣濟療飲氣痰膈食則嘔吐方 茯苓八分橘皮六分甘草四分生薑八分雞蘇六分人參四分 右六味切水五升

煮取一升五合去滓分溫二服服別相去如人行六七里進一服不利忌海藻松菜酢物卷中第一

千金順流紫丸療心腹積聚兩脇脹滿留飲痰癖大小便不利小腹切痛膈上寒方 代赭 烏鰂魚骨

炙半夏各三分巴豆七分去桂心四分石膏五分 右六味搗篩蜜和丸平旦服一丸如胡豆至二九忌羊

肉錫猪肉蘆筍生葱山第十八卷中通按此方比前紫丸

尚優錄于
金七分作
七枚

延年前胡湯主胸背氣滿膈上熱口乾痰飲氣頭風旋方 前胡二兩枳實二兩細辛二兩杏仁五枚芍藥五兩防

風 澤瀉二兩麻黃二兩乾薑二兩芍藥三兩茯苓三兩桂心二兩甘草二兩右十四味切以水

九升煮取二升六合分三服微汗忌生冷油滑猪肉麤海藻松菜生葱生菜酢物出第十卷中

古今錄驗薑附湯療冷胸滿短氣嘔沫頭痛飲食不消化方 附子六分生薑十二分右二味切以水八升

煎取三升二分合為三服忌猪肉冷水等出第九卷中

胃反方一十首

病源夫營衛俱虛血氣不足停水積飲在於胃管則藏冷藏冷而脾不磨脾不磨則宿穀不化其氣逆而

成胃反也則朝食暮吐暮食朝吐心下牢大如杯往來寒熱甚者食已則吐其脈緊而弦緊則為寒弦則

為虛虛寒相搏故食已則吐名為反胃也出第二十卷中

集驗療胃反不受食食已嘔吐大半夏湯方 人參二兩茯苓四兩青竹茹五兩大黃六兩橘皮二兩乾薑二兩澤瀉

甘草二兩桂心二兩右九味切以水八升煮取三升服七合日三夜一已利去大黃用泉水東流水尤

佳忌海藻松菜生葱大酢千金備急散文仲同方中無半夏未詳其名

又療胃反吐而渴者茯苓小澤瀉湯方 茯苓二兩澤瀉二兩半夏四兩桂心二兩甘草二兩右五味以水一

斗煮取二升半去滓服八合日三忌海藻松菜羊肉鰾生葱酢物等千金如生

又療胃反朝食暮吐食訖腹中刺痛此由久冷者方 橘皮二兩白朮二兩人參二兩蜀椒一百粒桂心二兩雞

白一握右六味切以水二升煮一宿內猪肚中縫合三升水煮水盡出之決破去滓分三服忌桃李

雀肉生葱千金用

又療反胃大驗方 前胡二兩生薑四兩阿膠一兩大麻子仁二兩吳茱萸五兩桂心三兩甘草五兩大棗十枚

右八物切以酒二升水三升煮取一升七合分再服忌生葱海藻松菜等物一方有橘

又療胃反吐食者方 搗粟米作粉水和作丸如梧子大七枚開煮內酢中細細吞之得下便已麤亦得

尚德按今有方一十
七首
尚德按今
食此主治
下即出五
味大半夏
湯別有此
治胃虛反
吐方并下
九方並在
今下文云
以上並與
千金同則
外並與
大半夏湯
方并此方
主治也

用之

又方 好麴十斤粗地黄二斤二味搗日乾酒服若飲三方寸匕日三服千金云治醉飽通按生地黃

又主胃反食則吐上氣者方 炙兩乳下各一寸以差為度

又方 炙臍上一寸二十壯

又方 炙內踝下三指稍邪向前有穴三壯即差

又方 蘆根茅根各二兩 右二味切以水四升煮取二升頓服得下食並出並與千金同

崔氏療食則吐或朝食夜吐名曰胃反或氣噎不飲食數年羸削唯飲水亦同此方錄送 製半夏

人參三兩生薑兩橘皮兩春杵頭一升牛蒡一兩厚朴二兩羚羊角三兩 右八味切以水八升煮取三

升分溫三服相去十里久欲煩服者可至三劑氣噎病者胃閉不受食唯飲水入吐出積年不差乃

至於死人間多有此病此方故療有效忘羊肉餒粘食

又華佗療胃反胃反為病朝食夜吐心下堅如杯往來寒熱吐逆不下食此為寒癖所作療之神效方

真珠 雄黃 丹砂各一兩朴硝二兩薑十 右五味搗篩蜜丸先食服如梧子二丸小煩者飲水則

解之忌生血物一方有桂心一兩必效云治心下堅痛胃反寒病所作方

救急療胃反方 昔在幼年經患此疾每服食餅及羹粥等物須臾吐出正觀中許奉御兄弟及柴將等

家時稱名醫奉勅令療罄竭口馬所患終不能瘳漸羸瘦候絕朝夕忽有一衛士而云服鹽小便極驗

此日服食二合然後食唯吐一半晡時又服二合人定時食粥吐便即定迄至今日午時奏知之大丙

中有五六人患胃反同服用一時俱差此藥稍有毒服時不可過多承取尿及熱服二合病若深七日

以來服之良後來療人並差必效同出第六卷中

必效人參湯主胃逆不消食吐不止方 人參 澤瀉 桂心各二兩橘皮 甘草炙黃耆各三兩茯苓四兩生

薑八兩麥門冬二升半夏一升大黃半兩 右十一味切以水一斗二升煮取三升二合服八合日三夜

尚德按肘後附方引外臺口馬人所患作各人所患作士而云此日服食四字作且服二字又按隔疑當作喘

外臺祕要

卷八

脾胃病日漸瘦困不食方三首

一服若羸人服六合已下去大黃忌海藻葶菜酢物生葱羊肉錫千金

又療胃反朝食夜吐夜食朝吐諸藥瘳不差方 羊肉去脂膜作脯以好蒜薑空腹任意多少食之立見

效驗

又療胃反吐水及吐食方 大黃四兩甘草二兩 右二味切以水三升煮取一升去滓分溫再服如得可

則隔兩日更服一劑神驗千金不傳忌海藻葶菜此本仲景得寒論方並出第二卷中

萬全方療脾飲食吐逆水穀不化此為胃反半夏飲子方 製半夏八兩朴炙人參 白木 生薑切棗

各六分粳米兩橘皮四分 右八味細切以水二大升煎取一升去滓分溫四服空肚服二服忌羊肉錫並出

第一卷中

脾胃弱不能食方三首

病源脾者臟也胃者腑也脾胃二氣相為表裏胃為水穀之海主受盛飲食者也脾氣磨而消之則能食

今脾胃二氣俱虛弱故不能食也尺脈浮滑速疾者食不消脾不磨也出第二十卷中

廣濟療脾胃氣微不能下食五內中冷時微下痢方 白木八兩神鞠兩甘草炙乾薑 枳實二兩 右

五味搗篩蜜和丸空腹溫酒服如梧子二十九日二服漸加至三十九腹中有痛加當歸二兩忌鯨海

藻松菜桃李雀肉等出第一卷中

延年人參飲主虛客熱不能食惡心方 人參 麥門冬去心橘皮 白木 厚朴各二兩茯苓兩生薑三兩

甘草一兩 右八味切以水八升煮取三升分為三服日三忌海藻葶菜桃李雀肉等將李喻處大發

又厚朴湯療不能食腹內冷氣方 厚朴三兩白木 人參各一兩茯苓三兩生薑五兩橘皮二兩 右六味切以

水四升煮取一升二合分為三服忌桃李雀肉酢物將李喻處出第六卷中

脾胃病日漸瘦困不食方三首

廣濟主脾胃中熱消渴小便數骨肉日漸消瘦方 黃連 麥門冬各十二分苦參 栝實 知母 茯苓

土瓜根各八分 人參 甘草各五分 右九味搗篩蜜和丸每食後少時煮蘆根大麥飲服如梧子二十丸

日二服漸加至四十丸不利忌海藻松菜猪肉冷水酢等物

又主胃氣冷弱食則吐逆從朝至夜不得食食入腹則脹氣滿急大便出飯粒如故帶酸氣而嘔計日漸

困者方 吳茱萸二兩 白朮三兩 人參 乾薑 甘草各五分 五味子各二兩 麴末 麥藥各五分 厚朴一兩 桂心一兩

右十味搗篩為散空腹煮生薑湯服方寸匕一日三服漸加至二匕忌生蔥桃李雀肉海藻松菜一卷

延年白朮丸療惡心數吐水不多能食少心力者方 白朮 乾薑 人參 厚朴 桂心各六分 細辛

茯苓 當歸 茯神 枳實各五分 五味子 附子炮 吳茱萸各六分 遠志五分 旋復花四分 澤瀉五分 右十六

味搗篩蜜和為丸梧子酒服二十丸日再服加至三十五丸忌桃李雀肉大酢生菜生蔥猪肉冷水出

胃實熱方二首

千金凡右手關上脈陽實者是陽明經也病苦頭痛脈經云陽中 汗不出如溫瘧脣口乾善噦乳癰缺盆

脈下腫名曰胃實熱也

療胃實熱湯方 梔子仁二兩 芍藥四兩 白朮五兩 茯苓三兩 生地黃汁一升 射干三兩 赤蜜一升 麻三兩 右八味

切以水七升煮六味取一升五合去滓下地黃汁兩沸次下蜜煎取二升分三服老小以意服之忌桃

李雀肉酢物蕪荑等

又方 灸膝下三寸兩脚三里穴各三十壯主胃中熱病

胃虛寒方七首

千金右手關上脈陽虛者是陽明經也病苦脰寒不得卧惡風寒洒洒目急腹中痛耳虛鳴時寒時熱脣

口乾面浮腫名曰胃虛冷也

尚德按千金茯苓射干兩升麻各一升下蜜煮取三升

又療胃虛冷少氣口苦身熱無澤補胃湯方 防風 柏子仁 細辛 桂心 橘皮各二兩 芍藥

黃 人參各三兩 甘草一兩 右九味切以水一斗者取三升分溫三服忌海藻松菜生葱生菜等物

又補胃虛寒身枯絕骨諸節皆痛人參散方 人參 細辛 甘草各六分 桂心 當歸 麥門冬各七分

乾薑八分 遠志四分 蜀椒三分 吳茱萸二分 右十味為散食後服方寸匕溫清酒進之忌海藻松菜生葱

生菜並出第十卷中

范汪療胃氣虛不欲食四肢重短氣調和五藏并療諸病調中湯方 薤白切一枳實六枚 橘皮三枚

十二 梗米三合 香豉六合 右六味切枳實橘皮棗以水六升先煮薤得四升內諸藥煮取一升半適寒溫

服中分服之良第一方生薑四分出

刪繁療胃虛苦饑寒病人參補虛湯方 人參 當歸 茯苓 桔梗 芍藥 橘皮 厚朴各三兩 桂心

甘草二兩 白木五兩 吳茱萸二兩 大麥二升 右十二味切以水一斗二升者取三升去滓分三服忌海

藻菰菜桃李雀肉生葱猪肉酢等物一卷中

又白朮八味等散方與前同 白朮 厚朴各二兩 人參 吳茱萸 麥藥炒 茯苓 芍藥 橘皮各三兩 右藥

搗篩為散食前服方寸匕煖酒進之隨性服忌桃李雀肉大酢出第四卷中

延年補胃飲主胃氣虛熱不能食兼渴引飲方 茯苓四兩 人參三兩 橘皮二兩 生薑三兩 薤白切一握 五合 糯米

合二 右七味切以水七升者取三升去滓分溫六服中間任食一日令盡忌酢物第一卷中

五膈方八首

病源五膈氣者謂是膈志膈氣膈寒膈熱膈也憂膈之為病胃中氣結煩悶津液不通飲食不下羸瘦不為氣力志膈之為病心下苦實滿噎輒酢心食不消心下積結牢在胃中大小便不利氣膈之為病胸脇逆滿噎塞胸膈不通噎聞食臭寒膈之為病心腹脹滿欬逆腹上苦冷雷鳴繞臍痛食不消不能食肥熱膈之為病藏有熱氣五心中熱口中爛生瘡骨煩四肢重脣口乾燥身體頭面手足或熱腰背痠痛胸痺

引背食不消不能多食羸瘦少氣及癰也此是方家所說五膈形證也經云陽脈結謂之膈言憂素寒熱動氣傷神而氣之與神並為陽也傷動陽氣致陰陽不和而腑藏生病結於胸膈之間故稱為膈氣單方說五膈互有不同但傷動之由有五故云五膈氣出第十卷中

備急膈中之患名曰膏肓湯丸徑過針灸不及所以作丸含之令氣勢得相熏染有五膈要丸方 客門冬十分 椒汗遠志 附子炮 乾薑 人參 桂心 細辛各六分 甘草十分 右九味搗篩以蜜和丸如

彈子以一枚著牙齒間含稍稍嚥汁日三主短氣胸滿心下堅冷氣此病有十許方率皆相類此丸最

效五膈者謂憂膈氣膈志膈熱膈寒膈也忌猪肉生菜海藻松菜生蔥十金附後文仲

張文仲五膈丸方 吳茱萸 麴 杏仁去皮 乾薑 蜀椒汗好豉 右六味等分搗篩蜜和丸如梧

子飲服七丸日三忌生冷此方出隱居效驗備急

延年祕錄凡憂膈氣膈食膈寒膈飲膈五病同藥常以憂愁思慮食飲而得之若寒食食生菜便發其病

苦心滿不得氣息引脊痛如刺之狀食則心下堅大如粉絮大痛欲吐吐則差飲食不得下甚者乃手足

冷上氣欬逆喘息氣短療以丸物五膈丸方 麥門冬去心 蜀椒汗遠志 各三兩 甘草五兩 附子炮 乾薑

三人參四兩 桂心 細辛各三兩 五膈要丸一味不差 右藥搗篩蜜和微使淖置有蓋器中先食服大如彈

子丸一丸置喉中稍嚥之喉中胸中當熱藥力稍盡復含一丸日三四夜一二服服藥七日愈二十日

平復若不能含者可一大丸作二小丸盡服之唯夏月合乃益麥門冬甘草人參耳其餘不異神良椒

當以銅器熬於火上使極熱下置地內椒器中熟攪之須臾汗出便搗合同處椒力有熱亦去其毒非

令有熱也忌海藻松菜猪肉冷水生葱生菜十金集驗同不能具

古今錄驗大五膈丸療膈中遊氣上下無常處藏有虛冷氣迫咽喉胸滿氣逆脇有邪氣食已氣滿羸瘦

著牀骨立往來寒熱腹中不調或下痢嘔逆欬嗽骨肉銷盡服之令人能食長肌肉強筋骨利五藏好顏

色補不足益氣力方 細辛 桂心 黃芩 食茱萸 厚朴各三分 杏仁三十枚 乾薑 川椒汗遠志 各

五膈方八首 七氣分三首

分去小草 芍藥 附子炮當歸 黃連各二 右十四味搗篩蜜和服如梧子二九日三不知加之
以知為度忌猪肉冷水生葱菜等

又五膈丸療憂膈氣膈食膈寒膈飲膈異病同藥神方 人參 附子炮遠志桂心 細辛各四 乾薑

蜀椒各五 右七味搗篩以蜜和服如彈丸著牙下咬咀嚥之若病劇者日三夜再并療諸毒風注氣

腹中百病皆應當得真新好藥即可中病耳神祕妙方不傳忌生葱生菜猪肉冷水等物通按此方同但少零冬甘草二味

又療邪氣嘔逆吸氣五膈為病五藏俱虛則受風冷五藏有邪呼吸不足陰注於內陽結於外陰陽錯亂

語言無常膈中左右狀如結氣喉咽不利氣出不入此血氣衰微藏凝冷氣成之服此丸安穀通氣溫藏

五膈丸出僧深方 蜀椒一斤 乾薑 桂心各二 芍藥半兩 半夏洗細辛 茯苓各一 前胡半兩 右八

味搗篩蜜和服如彈丸一枚喉中稍稍吞之可增至三丸或冷則加遠志一兩佳日再忌羊肉鴿生葱

生菜醋物

又療胸痛達背膈中煩滿結氣憂愁飲食不下藥悉主之宜丸方 製半夏分甘草 遠志各四分 乾薑

桂心 細辛 椒去目 附子炮各 右八味搗篩以蜜和為丸先飲酒若梗米飲服如梧子五九日三

稍增至十丸忌海藻菰菜羊肉鴿猪肉冷水生葱生菜並出第十卷中

經心錄五膈丸療寒冷則心痛咽中如有物吐之不出咽之不入食飲少方 乾薑兩三 零門冬二兩 附子

炮一兩 細辛兩 蜀椒汗 遠志去 甘草炙各一兩 人參 食茱萸兩 桂心三兩 通按此方即前 右十味蜜

和為丸如梧子服五九日二忌猪肉冷水海藻菰菜生葱生菜千金同出第二卷中

七氣方三首

病源七氣者寒氣熱氣怒氣志氣喜氣憂氣愁氣凡七種氣積聚堅大如杯若梓一作置在心下腹中疾
痛欲死飲食不能時來時去每發欲死如有禍祟此皆七氣所生寒氣則嘔吐惡心熱氣則說物不竟言

尚德按十
金四肢下
有肝腫二
字掌字下
有提字

尚德按十
金罰椒三
分人參半
夏桑胡桂
梗黃蒲吳
萊苈乾薑
細辛各二
分
尚德按十
金生薑一
兩

而迫一云快怒氣則上氣不可忍熱痛上澁心短氣欲死不得氣息志氣則積聚在心下心滿不得飲食
喜氣則不可疾行不能久立憂氣則不可劇作暮則不安常愁氣則喜忘不識人語置物四方還取不得
去處若聞急則四肢手足筋攣不能舉狀如得病此是七氣所生男子卒得飲食不時所致婦人則產中
風餘疾千金同出第
十三卷中

千金七氣丸方 烏頭七分 紫苑 前胡 半夏洗 細辛 丹參 茯苓 芎藭 桃仁去皮 吳茱萸

桂心 桔梗 石膏各三分 人參 甘草 防葵各四分 大黃七分 乾薑 蜀椒各二分 薑黃三分 右二十

味搗篩為末蜜和丸酒服如梧子三九日三加至十丸一方去半夏加甘遂三分忌海藻松菜羊肉鰾

豬肉冷水生蔥大酢生菜一方有芍
藥無薑蒲

又七氣丸主七氣七氣者寒氣熱氣怒氣志氣憂氣愁氣此七氣為病皆生積聚堅牢如杯心腹絞

痛不能飲食時去時來發則欲死凡寒氣狀吐逆心滿熱氣狀恍惚眩冒失精怒氣狀上氣不可當熱痛

上澁心短氣欲絕不得喘息志氣積聚心滿不得食飲喜氣狀不可疾行久立憂氣狀不可苦作卧不

安席愁氣狀平故怒氣喜忘四肢附腫不得舉止亦癰瘰後中風餘疾方 大黃一分 椒仁一分 人參 半夏洗

芎藭 柴胡 甘草二分 桔梗 石膏 薑黃 桃仁去皮 吳茱萸 茯苓各三分 乾薑四分 細辛三分 右十

五味搗篩蜜和丸如梧子酒服三九日三加至十丸忌羊肉鰾生蔥海藻松菜豬肉生菜酢物

又七氣湯瘡虛冷上氣勞氣方 半夏一分 生薑一分 人參 桂心 甘草一分 右五味切以水一斗煮

取三升分為三服日三忌羊肉鰾生蔥海藻松菜並出第十
七卷中

氣噎方六首 病源此由陰陽不和藏氣不理寒氣填於胸膈故氣噎塞不通而謂之氣噎令人喘悸背背痛也出第
二卷中

廣濟瘡噎胸膈氣噎通氣湯方 半夏洗 生薑各六分 橘皮 桂心各三分 右四味切以水八升煮取二升

煮取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里服忌羊肉生蔥鰾等出第
一卷中

深師療胸滿氣噎通氣湯方 半夏八兩 生薑六兩 桂心三兩 大棗三十枚 右四味切以水八升者取三升分

服五合日三夜一忌羊肉錫生葱二十卷中 集驗療氣噎方 蜜酥薑汁各一升 右三味合和微火煎五六大沸取如大棗二枚內酒中飲之直

抄服之亦好錄驗古今 又通氣噎湯方 半夏洗 桂心各三 生薑八兩 羚羊角三兩 右四味切以水八升者取三升分服半升日再

服忌羊肉生葱錄驗古今 救急療喉中氣噎方 半夏洗 柴胡 生薑各三 羚羊角三兩 厚朴二兩 吳茱萸 乾薑各三 通草 橘皮

右九味切以水八升者取三升分三服忌羊肉錫豬肉海藻松菜等 古今錄驗羚羊角湯療噎氣不通不得下食方 羚羊角二兩 厚朴二兩 吳茱萸 乾薑各三 通草 橘皮

右七味以水九升者取三升分三服日三忌豬肉冷水錄驗古今 諸噎方一十二首 病源夫陰陽不和則三焦膈絕三焦膈絕則津液不利故令氣塞不調理也是以成噎此由憂恚所致憂

意則氣結氣結則不宜流使噎噎者噎塞不通也出卷中 深師療噎方 羚羊角屑 前胡 甘草各一兩 人參 橘皮各二兩 右五味切以水六升者取二升分四服

忌海藻松菜 又方 鷓鴣菜 右一物當噎時以銜之則下肘後 又方 羚羊角 右一物多少自在末之飲服亦可以角摩噎上良出卷中 廣利方療因食即噎塞如炙肉饑在咽中不下方 吳射干六分 升麻 桔梗各四分 木通十二分 赤茯苓 百

合各八 紫宛頭二十枚 右七味切以水二大升煎取九合去滓分溫三服食後良久服忌豬肉酢物錄驗古今 中卷

尚書作

尚德按鐵
釜五到切
音微餅鑿
也燒器也
難入聲手
重按也俗
作徐鑿鑿
蓋以餅鑿
坐之蓋令
坐餅鑿上
也

千金理諸噎方 當食氣梗米飯即不噎

又方 炭末細羅蜜丸如彈子大含少細嚼津即下集驗同並出

集驗噎方 取頭垢如棗大以粥若漿水和服之出後諸師同

必效主噎方 鐵條大椎盡力則下仍令坐之通按鐵條木詳似

又方 以酢煮麴糊噉之則差此只可一兩日差欲長久絕者取搜為丸如彈子酢中煮熟於水中澤却

及熱則食二十丸神驗不過三兩度則差大效

又半夏湯主噎方 生薑四兩半夏一升石膏四兩小麥一升吳茱萸一升赤小豆二十大棗二十人參甘

草是桔梗桂心各二右十一味切以酒二升水八升煮取三升分三服忌猪羊肉海藻松菜錫生

蔥等古今錄驗有括葉無括又方 杏仁二兩桂心兩右二味末之蜜和丸含之如棗核許稍稍噉之臨食先含極效忌生蔥全千

同並出第 二卷中

古今錄驗噎方 蘆根三斤右一味切以水一斗煮取四升分四服出第二十

卒食噎方九首

病源此由藏氣冷而不理津液澀少而不能傳行飲食故食入則噎塞不通故謂之食噎胸內痛不得喘

息食不下是故噎也出第二十

肘後療卒食噎方 橘皮三兩右一味切以水三升煮取一升頓服之

又方 春杵頭練置手巾角以拭蓋立下集驗深師千金同

深師療卒噎法 傍人可緩解衣帶勿令噎者知則愈

又療卒噎方 與共食人當以手捉噎人筋問曰此等何物噎人當答言筋共食人云噎下去則立愈

又療卒噎不下方 水一杯 刀一口 右二物先以刀橫畫水已後盡飲之則下出第二十

卒食噎方九首 五卷中

十二

集驗療噎方 美活兩 接用水一升浸三宿每日溫服五合差

又療氣噎不下食氣嘔吐方 半夏四兩 生薑三兩 各切 右二味以東流水二大升煎取一升去滓溫服三

合日三服忌羊肉鰯魚

並出第
五卷中

備急療卒食噎不下方 取蜜含之則下 千金集驗
肘後同

又方 取老牛涎沫如棗核大置水中飲之終身不有噎必效 肘後海
並出第三卷中

五噎方三百

病源云五噎謂一曰氣噎二曰憂噎三曰食噎四曰勞噎五曰思噎雖有五名皆由陰陽不和三焦隔絕

津液不行憂志噎怒所生謂之五噎噎者噎塞不通也 出第
十卷中

古今錄驗五噎九療胸中久寒嘔逆逆氣隔飲食不下結氣不消氣噎憂勞噎食噎思噎氣噎者心悸

上下不通噎噎不徹胸脇苦痛憂噎者天陰苦厥逆心下悸動手足逆冷勞噎者苦氣隔脇下支滿胸中

填塞令手足厥冷不能自溫食噎者食無多少唯胸中苦塞常痛不得喘息思噎者心悸動喜忘目視瞠

瞠此皆憂勞噎怒氣上逆胸脇所致療之方 乾薑 蜀椒 汗 食茱萸 人參 桂心 各五兩 細辛 白

朮 茯苓 附子 炮各四分 橘皮 右十味搗篩以蜜和為丸如梧子酒服三九日再不知漸增忌桃李

崔肉天酢猪肉冷水生葱生菜酢物 出第
七卷中

經心錄五噎丸主五種之氣皆令人噎方 人參 半夏 桂心 防葵 一方用防
風小半 附子 炮 細辛 甘草

二兩 食茱萸 各三兩 乾薑 芍藥 枳實 炙 烏頭 炮 右十三味搗篩以蜜和為丸如梧子大服

五九日三不知加至十五九忌羊肉鰯魚菜豬肉生葱生菜 千金同出
第二卷中

集驗噎塞不通方 營實根 分十二 右一味搗為散酒下方寸匕日三服 出第
五卷中

諸骨哽方三十五首 肘後療食諸骨哽百日哽者方 用綿二兩以火煎蜜內一段使綿熱灼灼觸從外縛哽所在處灼氣

尚德按今
有方三十
四首
尚德按

以麝綿上若故未出復煮一段綿以代前并以皂莢屑少少吹鼻中使得嚏出矣秘方不傳禮云魚去乙謂其頭間有骨如乙字形者噁入不肯出故也

又方 取捕魚竹筍頭燒末飲之魚網亦佳

又療食諸肉骨哽方 白雄雞左右翮大毛各一枚燒末水服一刀圭也仍取所食餘者骨左右手反覆

擲背後則下也文仲備

又方 燒雞足末服方寸匕酒下立出深師

又方 生艾蒿數升水酒共一斗者取三四升稍稍飲之深師

凡療病皆各以其類豈宜以鷓鴣療肉骨狸虎療魚哽耶至於竹篾薙白嚼筋綿蜜事乃可通為諸哽用耳又有呪術小小皆須師解故不備載卷中

深師療食魚骨哽方 捕魚網燒飲服刀圭匕良是魚哽燒魚網服之良

又療哽及刺不出方 服薔薇灰末方寸匕日三亦療折箭刺入膿囊不出堅燥及鼠撲服之十日哽刺

皆穿皮出故

又療鐵棘竹木諸刺在肉中折不出及哽不下方 半夏洗白斂各二右二味搗篩酒服半錢匕日三

當從少少起者半夏戟人喉中故也忌羊肉錫等加乾薑一兩尤佳

又方 鼠腦厚塗瘡上則出亦可用墳鼠大效

又療哽方 螻蛄腦 右一物各即下亦療刺不出塗刺瘡上

又療咽哽方 取魚尾著衣領令下推立下

又方 白斂白芷等分搗散飲服刀圭

又療食哽方 鷹糞燒灰存性 右一物篩下服方寸匕虎狼鵲屎皆可服之佳

又療骨哽咽不得下飲食方 白雞翼翮大毛各一枚著銅器中燒之焦作灰飲服一刀圭立下

尚德按是魚哽以下與上文義相重疑有一誤
尚德按鼠腦即鼠腦
三曰鼠腦
謂鼠腦
者白朴主
云元作
蓋朴誤
音義相通

尚德按
刻後作
聲刻
尚德按
千金云
白今半
小噴之
云

又療哽方 半夏洗白並各五 右二物搗篩服方寸匕則嘔出忘羊肉湯

又方 以東流水一杯東向坐以手指畫水中作龍字訖飲水不自曉書令他人持手書良

又方 凡書文曰天有門地有根諸家入口者皆當得吞集驗同並出第十二卷中

千金療哽方 取鹿筋漬之漂索之大如彈丸持筋端吞之候至哽處徐徐引之哽着筋出集驗同

又方 極吹之食骨哽燒虎狼屎服

又方 未虎骨若狸骨服方寸匕集驗同

又方 服瞿麥末方寸匕集驗古今錄驗同

又方 吞鴛膏如雞子大不差更吞差止古今錄驗同

又療諸哽方 作竹篾刮令滑綿纏內咽中令至哽處可進退引之哽即出小品古今錄驗同

又療諸哽方 鷓鴣屎末服方寸匕集驗古今錄驗同

又療魚骨哽方 口稱鷓鴣鷓鴣則下並出第二十六卷中

張文仲療食諸魚骨哽方 以魚骨頭上則立下陶云因噤刻則出肘後備急同

又方 小鴨雛白令柔以繩繫中央持繩一端吞雛到哽處引便當隨出集驗古今錄驗同

又療魚骨哽在腹中眾法不能去者方 取飴糖丸如雞子黃大吞之不去又吞此用效得也肘後備急千金集驗同

小品

又療食中吞髮哽不去燒喉者方 取梳頭髮燒灰飲服一錢匕肘後備急集驗千金同並出第三卷中

救急療哽方 好蜜以一匙杪稍稍嚥之令下良文仲同

又療魚骨哽在喉中方 以少許硃砂口中咀嚼嚥之立下出第七卷中

必效療魚骨哽方 含水獺骨立出小品同

又方 魚網覆頭立下千金云燒灰服半匕小品同出第二卷中

古今錄驗療魚哽骨橫喉中六七日不出方 取鯉魚鱗皮合燒作屑以水服之則出也未出更服之取

出為度 出第二十卷中

雜誤吞物方一十七首

肘後療誤吞鈎方 若繩猶在手中者莫引之但益以珠璫若意子輩就貫之著繩稍稍令推至鈎處小

小引之則出

又方 以小羊喉以沓繩推至鈎處當退脫小引則出

又方 但大戾頭四向顧小引之則出

又方 常思草頭一把二升水淘灌之十餘過而飲之

又療誤吞諸木竹釵輦方 取布刀故鋸燒漬酒中以女人大指甲二枚燒末內酒中飲之

又方 若是桃枝竹釵但數數多食白糖自消去

又療以銀釵簪筋撻吐因氣吸誤吞不出方 多食白糖漸漸至十斤當裏物自出此說與葛氏小異 並出

第五卷中

孫師療誤吞鈎方 虎珀珠 右一物貫著鈎繩推令前入至鈎所又復推以牽引出矣若水精珠卒無

珠堅物摩令滑用之也 出第二十卷中

千金療誤吞環若指嘔方 燒鴈毛二七枚末服之鵝羽亦佳 簡急文仲同

又誤吞珠銅鐵而哽者方 燒弩銅牙令赤內酒中飲之立愈 出第二十卷中

張文仲療吞諸珠璫鐵而哽方 燒弩銅牙令赤內水中飲其汁立愈 肘後備急同

又療誤吞錢方 燒火炭末服方寸匕則出 肘後小品集驗千金同

備急葛氏誤吞釵方 取雞暴令著著令熟勿切食一大束釵則便隨出生麥葉若繫纒皆可用良效 針

肘後

又誤吞釘及箭金鐵等物方 多食肥羊肉脂及諸肥肉自糞出肘後千金文仲同並出第五卷中

古今雜驗療誤吞銀環及釵者方 取飴糖一斤一頓漸漸食盡多食之環及釵便出小品集驗十金作白糖

又方 取水銀一兩分服之釵便下去也亦可以胡粉一兩搗調之再分服食銀令如泥也若吞金銀物

在腹中皆服之令消烺出也

又療誤嚥鐵方 取真吸鐵磁石末酒白飲服一方寸匕解曰磁石持能吸取鐵難云今吞鐵哽在喉中

而服磁石末入腹耶若含磁石口中者或吸鐵出耳二理詳取其義焉小品集驗十金同出第二十九卷中

唐王壽先生外臺祕要方卷九目錄嗽二
十三門

效嗽方三首

五嗽方四首

新久嗽方三首

卒效嗽方八首

暴熱嗽方二首

冷效方三首

效失聲方四首

氣嗽方八首

呬效方二首

重效法六首

療效方一十四首

積年久效方二十一首

久效坐卧不得方二首

效嗽短氣方七首

九種效方一首

效逆及厥逆飲效方七首尚德按今有方六首

十效方七首

久效嗽上氣唾膿血及濁涎方五首

效嗽膿血方一十一首

久效嗽膿血方四首

效嗽唾粘方二首

許仁則療效方一十二首又按今有方一十一首

雜療效嗽方三首

尚德按嗽
疑當作效
尚德按嗽
疑當作效

尚德按效
字下疑脫
嗽字

尚德按效
字下疑脫
嗽字

唐王壽先生外臺秘要方卷九

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新 安 後 學 程 衍 道 衆 通 父 訂 梓

效嗽方三首

尚德按病
源與制字
宋本同
又按與字
上病源有
者字宋本
同

病源效嗽者由肺感於寒微者成嗽也肺王氣合於皮毛邪之初傷先客皮毛致肺先受之五藏與六腑為表裏皆稟氣於肺以四時更王五藏六腑皆有咳嗽各以其時感於寒而受病故以咳嗽形證不同五藏之效者乘秋則肺先受之肺效之狀效而喘息有音聲甚則唾血乘夏則心先受之心效之狀效則心痛喉中介介如哽甚則咽腫喉痺乘春則肝先受之肝效之狀效則兩左脇下痛甚則不可轉側兩脇下滿乘夏則脾先受之脾效之狀效則右脇下痛陰引於肩背甚則不可以動動則效劇乘冬則腎先受之腎效之狀效則腰背相引而痛甚則效逆此五藏之效也五藏效久不已傳與六腑脾效不已則胃受之胃效之狀效而嘔嘔甚則長蟲出肝效不已則膽受之膽效之狀效而嘔膽汁肺效不已則大腸受之大腸效之狀效而道遺心效不已則小腸受之小腸效之狀效而失氣氣與效俱出肝效不已則膀胱受之膀胱效之狀效而道遺久效不已則三焦受之三焦效之狀效而腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也又有十種效一曰風效效諸因效言不得效是也二曰寒效飲冷食寒注入於胃從肺脈上氣內外合因之而效是也三曰支效心下硬滿效則引四肢痛其脈反遲是也四曰肝效效而引脇下痛是也五曰心效效而唾血引手少陰是也六曰脾效效而涎出諸續不止下引少腹是也七曰肺效效引頸項而唾涎沫是也八曰腎效效則耳聾無所聞引腰并膕中是也九曰膽效效而引頭痛口苦是也十曰厥陰效效而引舌本是也診其右手寸口氣口以前脈手陽明經也其脈浮則為陽實陽實者病苦腹滿喜喘效脈微大為肝脾效引少腹效嗽脈浮大者生沈小伏匿者死又云脈浮直者生沈硬者死效且嘔腹脹且泄其脈弦弦欲絕者死效脫形發熱脈小硬急者死效且嘔腹脹絡脈大

硬者死效而尿血腫皮脈大者死

出第十卷中

小品瘡嗽紫苑七味湯方 紫苑兩半五味子兩桂心兩麻黃兩杏仁七十枚去皮乾薑甘草二兩

右藥切以水九升所取二升半去滓溫服七合日三服忌海藻松米生葱蒜麴膠出錄二卷中

延年紫苑飲主欬方 紫苑 貝母 茯苓 杏仁去皮尖生薑三人參二兩橘皮一兩右七味切

以水五升煮取一升五合去滓分溫三服如人行七里更進一服忌葱蒜麴酢出錄五卷中

古今錄驗天門冬煎療欬方 天門冬六兩杏仁三升去雙核三升桂心 厚朴炙杜仲 苦參各

兩附子炮乾薑兩各六兩頭二枚人參六兩蜈蚣一頭炙去右十二味別搗杏仁其餘者合搗下篩以五斤

膠飴和搗千杵服如大棗一枚日三服冷水飴肉生葱鯉魚出第九卷中

五嗽方四首

深師療五嗽一曰上氣嗽二曰欬嗽三曰燥嗽四曰冷嗽五曰邪嗽六曰滿丸方 乾薑 桂心 躑躅花

芎藭 紫苑 芫花根皮分各二人參細辛 甘草炙半夏洗鬼督郵各一兩蜈蚣一頭炙去右十二味

搗篩蜜和服如大豆五丸米飲下日三不知知之至七八丸服此丸無不差方祕不傳忌羊肉鵠生葱

生菜海藻松米

又玄 特生礬石一兩尼包一兩款冬花兩款冬花三百枚巴豆十六枚去皮心右四味搗篩蜜和服如大豆米

飲下二丸不知稍增至四五丸忌野猪肉蘆笋古今錄驗療三十卷中

備急華佗五嗽丸方 皂莢炙乾薑 桂心 右三味等分搗篩蜜和丸如梧子服三丸酒飲俱得日三

忌葱出第三卷中

古今錄驗四滿丸療五嗽一為氣嗽二為連嗽三為燥嗽四為邪嗽五為冷嗽悉療之方 蜈蚣二枚芫

花根五分躑躅花 乾薑 芎藭 桂心各四人參細辛各二右八味搗篩蜜和為丸一服米飲

下五丸如大豆許日三稍加至十丸忌生葱生菜出第十卷中

新久效方三首

深師療新久效嗽唾膿血連年不差晝夜肩息麻黃湯方 麻黃去節四兩 桂心二兩 甘草各二兩 大棗十四枚

右四味切以水九升煮取三升去滓分溫三服日三數用有效忌海藻牡蠣生葱等物

又療新久效嗽前胡丸方 前胡六兩 烏頭二枚 桂梗 乾薑各二兩 桂心 蜀椒八分 右六味搗篩蜜和

如櫻桃大一丸含化稍稍嚥之日三又療久效晝夜不得卧咽中水雞聲欲死者療之良忌豬肉冷水

生葱並出第十卷中

千金療新久咳嗽款冬花煎方 款冬花 乾薑各二兩 芫花根熟熱末 五味子 紫苑各三兩 右五味先

以水一斗煮三味取三升半去滓內芫花乾薑末加白蜜三升合投湯中令調於銅器中微火煎令如

飴可一升半服棗核大含之日三服曾數用甚良忌蒜鰾腥膩深師同出第十八卷中

卒效嗽方八首

肘後療卒效嗽方 釜月下土分 豉七分 右二味熬搗蜜丸如梧子大米飲服十四丸曾用有驗

又方 飴糖 乾薑末各六分 豉一兩 右三味先以水二升煮豉三兩沸去滓內飴糖消後內乾薑末分為三

服

又方 生薑汁 百部根汁 右二味合煎服二合並出第一卷中

張文仲卒效方 百部根兩 右一味酒一斗煮之再宿火溫服一升日再服之效肘後

又方 溫清酒 鹽膏各一升 右服之亦療上氣並出第三卷中

備急卒效嗽方 芫花二兩 右一味水二升煮四沸去滓內白糖一斤服如棗大勿食鹹酸物亦療久

效肘後

又方 爐中取鉛屑分桂心一皂莢去皮 右三味搗篩蜜和丸如梧子大人米飲下服十五丸小

兒五丸日二服忌生葱肘後同出第三卷中

尚德按煮
肘後作清

尚德按千
金款冬沙
乾薑各三
兩芫花一
兩五味子
二兩

深師療卒欬逆上氣肩息晝夜不止欲絕麻黃湯方 麻黃去心細辛各二兩甘草半兩杏仁二十枚去皮共

杏仁 右四味切以水七升煮取三升去滓分三服秘方忌海藻松菜生菜出第十八卷中

暴熱欬方二首

千金療暴熱欬杏仁飲方 杏仁四十枚去皮共柴胡四兩紫蘇子一升橘皮一兩 右四味切以水一斗煮取三

升分三服常服飲之不妨本方與紫蘇子有乾

延年貝母煎王暴熱欬方 貝母三兩紫苑五兩子百部根 杏仁去皮共兩甘草二兩 右六味切

以水五升煮取二升去滓和地黃汁三升生麥門冬汁一升白蜜五合好酥二合生薑汁一合又先取

地黃麥門冬及湯汁和煎減半內酥薑汁攪不得俾手又減半內蜜煎如稠糖煎成取如棗大含嚙之

日三夜再服忌海藻松菜鹹物將本證處出

冷欬方三首

深師療冷欬逆氣乾薑湯方 乾薑四兩紫苑一兩杏仁七十枚去皮共麻黃去節桂心 甘草二兩五味子一兩

右七味切水八升煮取二升七分合分三服平體人加射干一兩代乾薑忌海藻松菜生菜葱等

又療冷欬欬花從前方 羌活 乾薑各二兩白蜜二兩 右三味搗篩二味內蜜中攪令相和微火煎令如

糜服如棗核一枚日三夜一飲痢者多服出第十八卷中

千金療冷欬方 乾薑三兩膠飴一斤 右二味攪令和調蒸五升米下令熟以棗大含化稍稍嚙之日五

夜三出第十八卷中

欬失聲方四首

廣濟療咽喉乾燥欬語無聲音桂心散方 桂心 杏仁去皮共雙仁 右二味搗篩為散以蜜和綿

裹如棗大含之嚙汁日三夜二忌生葱油膩出第十八卷中 取花根一虎口 右一味含病人以薦

尚德樓
字下千金
有祇靈二
字

自紫葳裏春芫花根全飛揚入其七孔中當眼淚出口鼻皆羅刺柳通畢畢再勿住令芫花根盡則止
病必於此差

又療忽暴厥失聲語不出杏仁煎方 杏仁一升去皮尖通草四兩紫苑 五味子各三兩貝母四兩桑白皮五兩

蜜 沙糖 生薑一升 右九味切以水九升煮五味取三升去滓內杏仁脂薑汁蜜糖和攪微火上

煎取四升初服三合日再夜一稍稍加之忌蒜鰯炙肉等千金

又通聲膏方 五味子 款冬花 通草各三兩人參二兩杏仁一升去皮尖桂心 細辛 青竹皮 菖蒲

酪酥各二升膏三升白蜜 薑汁各一升 右十三味細切以水五升微火煎三上三下去滓內薑汁棗膏

煎令調和酒服如棗二枚忌生菜生葱羊肉錫升金用酥五升棗膏各二升同並出第十九卷中

氣嗽方八首

病源夫肺主氣候皮毛人有運動勞役其氣外洩腠理則開因乘風取涼冷氣卒傷於肺即發成嗽故為

暴氣嗽其狀嗽甚而少涎沫出第十卷中

古今錄驗療患氣嗽并下焦冷結方後四方同標紫苑 貝母 百部根 款冬花 五味子 半

夏洗各五分射干 針芫花根皮四分切乾薑 橘皮各四分杏仁八分蘇子四分白石英八分鍾乳十分

右十四味搗篩以蜜和為丸如梧桐子酒服十丸日再稍加至三十九丸忌羊肉鵠諸生冷等物

又方 乾地黄 桂心 山茱萸 五味子各三兩茯苓四兩後卷 丹參 澤瀉 甘草炙鍾乳二兩 右

十味搗篩蜜和酒服十五丸如梧子大日增至三十九丸忌海藻生葱醋物松菜薑蔥

又酒方 丹參 乾地黄各五兩芫萸 石斛 牛膝 黃耆 白朮 茯苓各四兩防風 獨活 附子炮

秦朮 桂心 乾薑各三兩乳六分 右十五味切以酒三斗浸七日初服二合日再稍稍加之忌食

桃李雀肉生葱猪肉冷水煮羹

又丸方 乾地黄四兩防風 茯苓 澤瀉各三兩山茱萸 丹參 五味子 後神方作茯苓桂心一兩

右九味搗篩蜜和丸如梧子酒服二十丸日再稍加至三十九丸忌醋物生葱薤薹並出第十卷中

延年杏仁煎主氣嗽方 好杏仁一升去皮六兩仁者酥熬糖合蜜五生薑汁各一貝母八合別蘇子汁一升以

和連取汁右七味先搗杏仁如泥內後六味藥合煎如稠糖取如棗大含嚙之日三但嗽發細細含

之忌猪肉燒炙

又療氣嗽前方 貝母 紫苑 百部根炙款冬花 甘草炙各二桂心二右六味切以水六升煮取一

升五合去滓內後藥

生地黃汁三生麥門冬汁 生薑汁 白蜜 酥 白糖各五杏仁三合去皮共煎如糖一

匙日三稍加至三匙嗽定則停忌海藻生葱薤薹蒜醋鹹食猪肉等

又療氣嗽杏仁煎方 杏仁五合去皮生薑汁合酥合蜜合右四味以水三升研杏仁取汁內銅鑪中

煎攪可減半內薑汁煎如稀糖內酥蜜煎令如稠糖一匙日三服夜一服稍加至兩匙忌猪肉

又杏仁煎主氣嗽方 杏仁一升去皮共白蜜各三右三味以水三升研杏仁令味盡內銅

鑪中煎可減半內酥蜜煎二十沸內貝母末四分紫苑末三分甘草炙末一分更煎攪如稀糖一服一

匙日三夜一服以效嗽止為度大驗忌蒜猪肉並出第十卷中

叩效方二首

病源叩效者猶是效嗽也其胸膈痰飲多者效則氣動於痰上搏咽喉之間痰氣相擊隨效動息呀叩有

聲謂之叩效其與效嗽大體雖同至於投藥則應加消痰破飲之物以此為異耳出第十卷中

崔氏三十年以來叩效并療之方 苾若子新南育木香真黃無石右三味等分搗篩為散以羊脂

塗青紙一張以散藥者紙上卷裹之平旦空腹燒裏頭令煙出吸取十嚙日中時復吸十嚙日晚後吸

十嚙七日內禁生冷醋滑三日則差出第六卷中

古今錄驗療叩效書墨丸方大神驗萬年縣令席君懿送 書墨 甘遂 葶藶子各二分前胡 大黃各五

尚德按病
原叩效者
效並作嗽

尚德換千
金復作後
無石其
烟從其
中出七
作烟從
出四字
昨日餘
後日復
之九字
尚德換
金復作
作烟從
中出七
作烟從
出四字
昨日餘
後日復
之九字
尚德換
金復作

分巴豆二升去 右六味搗篩為散巴豆辛應別細研蜜和丸如梧子以白蜜粥清飲且空腹服三丸
人弱服二丸則利水或吐三日以後更一服還如上法不過三服愈療三十年效如利不止者以冷白
飲止之吐利止後食禁生冷醋滑豬魚雞鰯油酒冷水蒜蘆筍此藥宜春夏服之有毒之藥當從少起
廣濟藥局上氣喉中作
水腫喉出第十九卷中

重效法六首

千金療效重法 細熟艾薄薄布紙上廣四寸復以石硫黃末塗布艾上務令調勻以花一枝如紙長卷

之作十枚先以火燒燼下去從其煙從從孔中出口吸取煙燻之取吐止明日復重之昨日餘者後日
復重之三日止自然差惟得食白糜餘皆禁之
古令錄

又法 重黃研令細以蠟蠟紙并上重黃令與蠟相入調勻卷之如前法燒之亦如上法日一二止以
吐為度七日將息後羊肉羹補之

又法 爛青布廣四寸上布艾艾上又布青礬石末礬石布少重黃末又布少鹽又布少豉末急卷之燒
令著內燥罐中以紙蒙頭作小孔以口含取煙燻之以吐為度悶時復息煙盡止日一二用三卷用不

盡差三七日慎油膩並出第十

崔氏療久效不差重法 款冬花 右一味每旦取如雞子許用少許蜜拌花使潤內一升鐵鍋中又用

一瓷碗合鑄碗底鑽一孔孔內插一小竹筒無竹葦亦得其筒稍長作碗鑄相合及插筒處皆鈐塗之
勿令漏煙氣鑄下著炭火少時款冬煙自從筒中出則口含筒吸取煙燻之如覺心中少悶須暫舉頭

即將指頭捻筒頭勿使漏煙氣吸煙使盡止凡如是三日一度為之待至六日則飽食羊肉鱗鮓一頓
則永差出第六

古今錄驗療效飲呼合切 煙法 鍾乳研白石英研人參 丹參研雄黃研各水銀二分烏羊腎脂一淨

紙張十 右八味各按為末以水銀投藥裏細研使入諸藥羊脂取置紙中令均平使厚一分散藥

令周遍剪紙一張作三分瘦弱婦人五日用半寸市末服藥前齋五日服藥後一百日忌五辛酒肉此
一劑得療五十人上氣者皆愈忘生血物

又療效腹脹氣上不得卧身體水腫長孫振重法 蠟紙一張熟艾薄布過紙上 重黃末三散冬花末
分 右三味并過布艾上著一葦筒卷之寸別以繩繫之燒下頭欲煙噦之亦可三十噦欲訖則差欲
盡三劑一百日斷鹽醋日一每飲三寸三日盡一劑出第十卷中

療效方一十四首

海師療效方 巴豆炮去膜 白飲吞下初日飲服二枚二日三枚良忌野猪肉蘆笋同金

又方 蜀椒去目 杏仁去皮共半合 宋鼓半合 宋本少多 散冬花如敗半合 宋本
蜜和為丸晚間不食含一丸如彈丸大含一丸則知效驗十年者五六日知良並出第十卷中 右四味搗

小品療效生薑五味子湯方 五味子合生薑 紫莞兩半 吳茱萸兩一 款冬花兩半 細辛兩一 附子一枚

炮茯苓兩四 甘草兩二 桂心兩一 右十一味切以水一斗煮取五升分溫三服老人可服五合忌海藻松

菜猪肉冷水羊肉錫生菜醋物生葱出第一卷中 右二味先研杏仁取汁使盡細切紫莞更煎少濃去滓內蜜

備急療效方 杏仁半斤 紫莞兩二 右二味先研杏仁取汁使盡細切紫莞更煎少濃去滓內蜜

使稠細細飲之立定出第三卷中

崔氏療效方 杏仁一升 蘇子汁五 生薑汁五 蜜五合 煎 右四味先搗杏仁作脂訖內諸藥和

煎攪調三四沸藥成含嚥如棗大日三四忌蒜出第六卷中

延年紫莞飲主效方 紫莞半兩 貝母二兩 人參兩一 橘皮兩半 薑兩一 杏仁一兩半 右六味切以水二

升五合煮取八合分三服欲再服亦得漢賦醋蒜新 右三味合搗為丸如棗大含之無不差

必效療效方 棗一百二十 豉一百 桃仁一百 杏仁一百 右三味合搗為丸如棗大含之無不差

又方 難子白皮十四枚 麻黃黃二兩 右二味搗成散每服方寸匕日二食後飲下之無所忌

又方 麻黃一斤 紫苑二兩 貝母三兩 右三味搗篩蜜和丸如杏核綿裹含稍稍嚥汁盡更作日四五度

又方 杏仁一百二十枚 豉一百枚 乾棗四十枚 右三味合搗如泥丸如杏核含嚥令盡日七八度盡

更作

古今錄驗百部湯療嗽晝夜不得眠兩眼突出方 百部兩半 生薑兩半 細辛兩 貝母各二兩 杏仁四兩

去皮二兩 紫苑三兩 桂心兩 白朮各二兩 麻黃六兩 五味子兩 右十一味切以水一斗二升煮取三升分三

服忌桃李棗肉海藻松菜生菜千金與杏仁 紫苑同

又療嗽噲散方 細辛兩 紫苑兩 天雄兩 石膏兩 款冬花兩 鍾乳石二兩 右六味搗篩作散如大豆七散

以小竹筒噲服日二不得食生魚醬醋生菜但食糜七日款愈乃止若大豆聚不知亦小益勿大多甚

良忌生菜冷水猪肉千金

又療嗽麻黃五味子湯方 麻黃四兩 五味子五兩 甘草炙半兩 半夏二兩 乾薑五兩 細辛兩 桂心兩 杏仁三兩 右八味切以水一斗煮取四升去滓溫分五服日三夜二忌海藻松菜羊肉錫生菜生葱

又療嗽羊肺湯太醫史脫方 款冬花兩 紫苑兩 乾薑兩 細辛各一兩 桂心兩 甘草炙各半兩 五味子半兩 白朮兩

食茱萸兩 羊肺細切 右十味切以水八升合煮取三升去滓一服三合日三禁食鹽蒜生菜海藻

松菜生葱並出第十卷中

積年久款方二十一首

病源肺感於寒微者則成款嗽久款嗽是連滯歲月經久不差者也凡五藏皆有款嗽不已則各傳其腑

諸久款不已三焦受之其狀效而腹滿不欲食飲此皆寒氣聚於胃而關於肺使人多涕唾而變面浮腫

氣逆故也出第十卷中

深師療五藏款積年劇則上氣不得卧喉中如有物醫所不療五愈丸方 桂心兩 細辛兩 乾薑兩 白朮兩

甘草炙各半兩 蜀椒汗代醋 通草兩 款冬花兩 芫花一分 伏龍肝兩 紫苑兩 牡蠣各二兩 右十三味搗篩

師

以飴糖和之搗令調和如棗核丸含之稍稍嚼其汁盡復含令胸中熱為候不知以意加之其久病重者晝夜二十餘丸若一歲效者一月愈十歲效者百日愈忌海藻松菜生葱生菜等

又療三十年效花前方花二乾薑三兩右二味以水五升煮花取三升去滓內薑末加蜜一

升合前之如糜一服如半棗日三不知加之一方不用乾薑取花汁蜜和煎令可丸服如梧子三九日三

又療三十年效氣奔上欲死醫所不療海藻丸猪仲堪方海藻三麥門冬五分昆布乾薑細辛

文蛤桂心蜀椒二各右八味搗篩蜜和服如杏仁許夜卧一丸著舌上稍稍嚼汁盡更著一丸

忌生葱生菜等

又療三十年效嗽上氣短氣久冷五藏客熱四肢煩疼食飽則劇時有發甚不能行步夜不得卧多夢香

鼓丸香鼓四分杏仁二分去共紫苑桂心各三分甘草八分乾薑二分細辛三分吳茱萸二分右八味搗篩

蜜和服如梧子四九日三不知增之能含嚼嚥汁亦佳忌海藻松菜生葱生菜

又療三十年上氣效嗽款冬花丸方款冬花六分桂心四分紫苑六分杏仁四分去共附子二兩藜蘆四分乾薑

六甘草七分細辛六分防風八分羌活六分蜀椒汗野葛四分右十三味搗篩蜜和丸如梧子服三九

稍加日三服忌生葱辛鹹醋猪肉冷水海藻松菜生菜狸肉等一方十四味此方

又療三十年效逆上氣咽喉如水雞鳴或唾膿血師藥不能療者方香鼓三升蜀椒汗一升乾薑一斤猪肪

斤三右三味搗篩內肪中以水五升合鼓等物熟煎每以二合服之大效

又療三十年效嗽七星散方蜀椒汗桑根白皮芫花根皮款冬花紫苑代赭細辛伏

龍肝各一右八味搗為散取作七星散服如棗豆大以竹筒口當藥上一一嚼嚥之令藥入腹中先

食訖即服藥日三服後三日不差復作七散以一餅肉炙令熟以轉展藥散上令藥悉在炙肉中仰卧

吹咀炙肉汁令藥力散散皆毒螫咽中藥力盡吞肉前後所療皆不至食肉便愈若不愈復作如初法

筋字下宋
本有藥字

高德按九
字下疑脫
方字
香鼓下款
字宋本作
熟
七宋本作
六

尚德按
疑當作

必愈乃止羊牛鹿肉皆可用勿用猪肉忌生菜

千金延年不用根與花根餘同並出第十八卷中

千金療三十年嗽方 蜜一斤生薑二斤 右二味先秤銅銚知斤兩訖內蜜復秤知斤兩次內薑汁以

微火煎令薑汁盡准有蜜斤兩在止且服如棗大含一丸日三禁一切雜食

又療三十年嗽方 紫苑二款冬花三兩 右二味為散先食飲服一錢七日愈

張文仲古今錄驗深師同

又療三十年嗽方 百部根一斤 右一味搗取汁煎之如飴以溫粥飲服方寸七日三服深師方白蜜二

升更煎五六沸服三合有驗

又療久嗽不差方 兔矢四十枚 胡桐律分 礪砂分 右三味搗篩蜜和為丸服如梧子三丸令吐冷物盡

則差

並出第十卷中

延年療久嗽不差方 豬腎一具去脂膜 椒二十八顆 右二味取腎一顆上作十四孔取椒內孔中兩腎揔

著二十八顆了以水緩煮令熟割破細切噉之令盡有驗

張文仲處出第五卷中

崔氏療積年嗽喉中啞聲方 羌花根白皮六分切熟 貝母分 款冬花分 百部根八分 杏仁十分去 皂

莢四分去皮子 五味子六分 蜈蚣半枚炙 桑白皮六分 麻黃分 紫苑分 右十一味搗篩蜜和為丸如梧子大一

服五丸日再服加至十五丸者藥汁送之

出第六卷中

必效療咳嗽積年不差者胸膈乾痛不利方 紫苑一大 杏仁四十九枚去 酥蜜各一 右四味紫苑

及杏仁各別搗先煮酥蜜攪令和內紫苑杏仁研破塊煎十餘沸藥成出爇器中每日空腹服一彈丸

細細含嚥之忌酒醢及猪肉等凌空道士得此方傳效不復可言

又方 葇荑二分以水淘去淨者水煮 酥一雞大 右三味鑊中煎令酥盡取葇荑去皮食之日二

又方 生薑五兩半大 右二味取薑刮去皮如算子切之置錫中微火煎薑使熟食盡則差段侍御

用之極效

又方 款冬花 右一味和蜜火燒令取煙嚥之三數度則差

久咳坐卧不得方二百 咳嗽短氣方七百 六

又方 取萸荅子三指撮吞唾嚥之日五六度光祿李承自服之極神效並出第

古今錄驗療人三十年寒冷效逆上氣麻黃湯方 麻黃去節蜀椒四分細辛三分薑本二分杏仁五十枚去仁

右五味切以水七升煮取三升分為三服日三忌生菜

又許明療人久嗽欲死方 取厚榆皮削如指大去黑剋令如鋸長尺餘內喉中頻出入當吐膿血則愈

又香豉丸療上氣三十年效氣久寒冷痺脾中客熱變為冷方 食茱萸 甘草各一香豉二十細辛

杏仁去尖皮兩仁藥宛二 右六味搗篩為末別搗杏仁如膏乃內末攪令勻蜜和丸如梧子服三丸

日三不知增之至五丸暮卧時含十丸著咽喉中嚥之忌海藻松菜生菜出第

久嗽坐卧不得方二百 九卷中

集驗療久患氣嗽發時奔喘坐卧不得并喉裏呀聲氣欲絕方 麻黃去節杏仁去尖皮兩 紫苑各三柴胡

橘皮各四 右五味切以水六升煮取二升半去滓分三服一劑不差頻兩三劑從來用甚驗張文仲

中四卷

備急療久嗽奔喘坐卧不得并喉裏呀聲氣絕方 麻黃去節乾蘇葉 橘皮各三柴胡 杏仁去尖皮兩

四 右五味切以水六升煮取二升半分三服服兩劑必差甚效張文仲中出

效嗽短氣方七百

病源肺主於氣候於皮毛氣虛為微寒客於皮毛傷於肺氣不足則成效嗽夫氣得溫則宣和得寒則痞

澀虛則氣不足而為寒所迫併聚於肺間不得宣發故令嗽而短氣也出第

深師療傷中效嗽短氣腸中痛流飲厥逆宿食不消化寒熱邪癖五內不調肉菰容湯方 肉菰容五乾

地黃四大棗二十枚烏頭一兩 甘草炙 桂心 紫苑 五味子各二生薑 石膏碎 春門冬去心各

右十一味切以水一斗五升煮取七升去滓分為七服日四夜三一方用大棗五十枚水一斗二升煮

取九升忌海藻生葱蒜菜蕪薤猪肉冷水

尚德按不
利千金作
下利

尚德按千
金李應二
分巴豆半
朴各三分
餘杏仁以

又療上氣咽喉室塞短氣不得卧倚壁而息腰背苦痛支脇滿不能食面色痿黃貝母飲方 貝母 石

膏綿裹桂心 麻黃去甘草炙各二兩杏仁三十枚去共生薑五兩右八味切以水一斗煮取三

升去滓分三服忌海藻松菜羊肉生葱錫等

又療效而不利胸中痞而短氣心中時悸四肢不欲動手足煩不欲食肩背痛時惡寒海藻湯方 海藻

四茯苓六兩夏洗五味子各五兩細辛二兩杏仁五十枚去共右六味切以水一斗煮取三升分三服忌

羊肉錫生葱醋物一方有生薑一兩十金同此第十八卷中

古今錄驗五味子湯療逆氣效嗽胸膈中寒熱短氣不足方 五味子兩前胡三兩紫苑 甘草炙桂心

生薑各二兩棗三十枚山茱萸三兩右八味切以水一斗煮取七升絞去滓服一升日三夜三忌生葱海藻

松菜廣濟方用橘皮不用菜莢

又胡椒理中丸療效嗽逆氣不能飲食短氣方 胡椒 藜蘆 乾薑 欬冬花 甘草炙橘皮 高良

薑 細辛各四兩白朮五兩右九味搗篩蜜和丸如梧子一服五丸日再忌桃李雀肉生菜海藻松菜

又瀉肺湯療效逆短氣方 人參三兩生薑四兩半夏五分甘草四分橘皮二兩竹葉二兩右六味切以水六

升煮取二升分三服此方亦療霍亂忘羊肉錫海藻松菜

又療效嗽及短氣脇痛薑椒湯方 生薑 椒各一兩右二味切以水五升煮取三升每服一合並出第十

九卷

九種效嗽方一首

千金九種氣效嗽欲死百病方 乾薑二兩夏洗細辛 紫苑 吳茱萸 芫花 茯苓 甘遂 防葵

甘草炙人參 烏頭炮大黃 葶藶子炙巴豆去皮厚朴炙杏仁去皮共兩仁五味子 遠志去枳實

炙 皂角去皮當歸 桂心 前胡 菖蒲 大戟 蜀椒各半白薇三分右二十八味搗合蜜丸先食

服如梧子二九日三以知為度不知增之忌海藻松菜羊肉錫生葱酢物野猪肉蘆葦一方無也豆非

上十四味
各五分
尚德按今
有方六首

尚德按十
斤作升
汁作切

尚德按要
略麥門冬
七升大棗
十二枚干
金大棗二
十枚

外 吉 生 秘 要 卷九

欬逆及厥逆欬方七首

出第十
八卷中

欬逆及厥逆欬方七首

病源欬逆者是欬嗽而氣逆上也氣為陽流行肺藏宣發腠理而氣肺之所主也欬病由肺虛感微寒所成寒搏於氣氣不得宣胃逆聚還肺肺則脹滿氣逆不下故為欬逆其狀欬而胸滿氣逆轉背痛汗出尻陰股膝踰跖足皆痛也其湯射鍼石別有正方補養宣導今附于後養生方導引法云先以鼻內氣乃開口欬還復以鼻內氣欬則愈向晨去枕正偃卧伸臂脛瞑目閉口無息極脹腹兩足再息頃間吸腹仰兩足倍拳欲自微息定復為之春三夏五秋七冬九蕩滌五藏津潤六腑又云還向反望側望不息七通療欬逆胸中病寒熱

出第十
四卷中

深師療欬嗽短氣不得息發熱胸苦滿不得飲食五味子湯方 五味子二桂心 甘草炙細辛各一乾

薑三兩紫苑二兩一兩大棗二十枚麻黃去節

右八味切以水八升煮取三升分三服無乾薑生薑亦得忌

海藻松菜生菜生葱

出第十
八卷中

千金竹皮湯主欬逆下血不怠方

生竹皮二兩紫苑二兩飴糖一斤生地黃汁一

右四味切以水六升煮取

三升分三服忌薑蔥

深師

又療大逆上氣喉咽不利止逆下氣麥門冬湯主之方 麥門冬二升半夏一升

去心

人參

甘草炙各一兩

三升大棗十四枚

右六味切以水一斗二升煮取六升服半升日三夜一忌羊肉鰾海藻松菜

傷寒論方

並出第十
八卷中

古今錄驗療厥逆藏氣有餘寒氣虛勞憂氣驚氣其人善悸胸中或寒上下無常多悲傷流四肢臍四邊

常有核游腫大便秘不利遊氣湯方 厚朴四兩 人參 甘草炙 牡蠣二兩 茯苓四兩 桂心 半夏一兩 梔子

四生薑八兩黃芩三兩 右十味切以水九升煮取三升半去滓分服七合日三夜再服若腹痛去黃芩加

芍藥三兩良驗忌海藻松菜生葱羊肉鰾鰾物等

尚德按六
款當作七

尚德按干
金下字上
有不字無
灸刺之灸
字下五灸
字重作刺
字水作琢
琢式損切
音稅腫病

尚德按方
疑當作本

又療效逆上氣丸方 乾薑四兩桂心 款冬花各一兩附子四枚五味子二兩巴豆十枚去皮心一右六味
先搗上五味下篩別搗巴豆如膏內藥末以蜜和丸如麻子以一丸著牙上咬咀常暮卧時服亦可日
三服忌生葱豬肉蘆笋

又小胡椒丸療寒冷氣逆胸中有冷咽中如有物狀吐之不出方 胡椒五分乾薑六分款冬花三分右三味
搗篩蜜和丸如梧子大米飲服三九日再服以知為度禁如前法並出第十卷中

十效方六首

千金問曰效病有十何謂也師曰有風效有寒效有支效有肝效有心效有脾效有肺效有時效有膽效
有厥陰效問曰十效之證何以為異師曰欲語因效言不得終謂之風效飲冷食寒困之而效謂之寒效
心下堅滿效則支痛其脈反遲謂之支效效引脇下痛謂之肝效效而唾血引手少陰謂之心效效而涎
出續續不止下引少腹謂之脾效效引頸項而唾涎沫謂之肺效效則耳無所聞引腰并臍中謂之腎效
效而引頭痛口苦謂之膽效效而引舌本謂之厥陰效夫風效者下之寒效支效肝效灸足太衝心效灸
刺手神門脾效灸足太白肺效灸手太泉腎效灸足太谿膽效灸足陽陵泉厥陰效灸手太陵留飲效者
其人效不得卧引項上痛效者時如小兒瘰癧狀天久效為水效而時發熱脈在九菽一云者非虛也此
為胸中實所致也當吐之效家其脈弦欲行吐藥當相人強弱無熱乃可吐耳通論太泉

又效家其人脈弦為有水可與十棗湯下之不能卧坐者陰不受邪故也

又夫有支飲家效煩胸中痛者不卒死至一百日一歲與十棗湯方 芫花 甘遂 大戟並洗右三
味搗下篩以水一升五合煮大棗十枚取八合絞去滓內藥末強人取重一錢贏人半錢匕頓服之平

旦服而不下者明旦更益藥半錢下後自補養古今集驗同此方 仲景傷寒論方

又效而引脇下痛者亦十棗湯主之用前

又夫酒客效者必致吐血此坐久極飲過度所致也其脈沈者不可發汗久效數歲其脈弱者可療實大
外志全 必 要 卷之九 十效方六首

數者死其脈虛者必苦胃也其人本有支飲在胸中故也治屬飲家上氣汗出而數屬飲家飲而小便利若失溺不可發汗發汗出則厥逆冷

又欬逆倚息不得卧小青龍湯主之 麻黃 桂心 乾薑 甘草 五味子 半夏

洗各半升 右八味切以水一斗先煮麻黃減二升去沫乃內諸藥煮得三升去滓服一升若渴者去半夏

加栝蒌根三兩微利者去麻黃加羌活如雞子大熬黃若食飲噎者去麻黃加附子一枚炮去皮六片

破小便利不利少腹滿者去麻黃加茯苓四兩若喘去麻黃加杏仁半升去皮尖兩仁者熬芫花不主利

麻黃止喘今語反之疑非仲景意加減忌海藻松菜生蔥生萊羊肉錫此本妙藥

青龍下已多唾口燥寸脈沈而尺脈微手足厥逆氣從少腹上衝胸咽手足痺其面翕熱如醉狀困復下

流陰股小便難時復胃者可與茯苓桂心甘草五味子等湯主之治其氣衝方 茯苓 桂心 甘草 三

災五味子半 右四味切以水八升煮取三升去滓溫分三服忌海藻松菜生蔥方今於仲景方附錄

在後

衝氣則抵而反更欬胸滿者與茯苓甘草五味子去桂心加乾薑細辛以治其欬滿方 茯苓 甘草 炙

乾薑 細辛 各三 五味子 半 右五味切以水八升煮取三升去滓溫服一升日三忌海藻松菜生菜

醋等物

欬滿即止而復更渴衝氣復發者以細辛乾薑為熱藥也服之當遂渴而渴反止者為支飲也支飲法當

冒胃者必嘔嘔者復內半夏以去其水方 茯苓 甘草 炙乾薑 細辛 各三 五味子 半 右

六味切以水八升煮取三升去滓溫服一升日三忌海藻松菜生菜羊肉錫酢等

水去嘔則止其人形腫可內麻黃以其人遂痺故不內麻黃乃內杏仁也若逆而內麻黃者其人必厥所

以然者以其人血虛麻黃發其陽故也方 茯苓 乾薑 細辛 各三 五味子 半 右

升甘草 二兩 右七味切以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三忌海藻松菜生菜羊肉錫酢等

尚德按一升十金作

尚德按三升十金作二

尚德按低

尚德按今

尚德按
宋本同

尚德按
千金作三

病源欬嗽膿血者損肺傷心故也肺主氣心主血肺感於寒微者則成欬嗽傷於陰脈則有血血與氣相隨而行欬嗽極甚傷血動氣俱乘於肺以津液相搏蘊結成膿故欬嗽而有膿血也出第十卷中

廣濟療癰瘰吐膿損肺方 人參二分 瓜蒂分 杜衡分 右三味搗篩為散平旦空腹以熱湯服方寸匕當吐痰水惡汁一二升吐已復煮白粥食淡水土盡停三日更進一服忌生冷油膩猪魚用杜衡三分

參一分服一錢
七出第二卷中

深師療欬逆唾膿血雞子湯方 雞子一枚 甘草二分 甘遂分 大黃 黃芩各二分 右五味切以水六升煮

取二升去滓內雞子攪令調盡飲之良忌海藻松菜

又療傷肺唾血方 茅根 右一味搗篩為散服方寸匕日三亦可絞取汁飲之主熱渴出第四卷中

刪繁療肺偏損胸中應肺偏痛唾血氣欬欬冬花散方 款冬花 當歸各六分 桂心 芎藭 五味子 附子七分 細辛 貝母各四分 乾薑 乾地黄各八分 白朮 甘草各二分 杏仁各五分 紫苑三分 右十四味搗

篩為散清酒服方寸匕日二服忌生葱生菜桃李雀肉海藻松菜猪肉燕羹出第五卷中

千金百部丸主諸欬不得氣息唾膿血方 百部根兩二升 麻兩半 桂心 五味子 甘草各一分 紫苑 乾薑各

兩 右七味搗篩蜜和丸如梧子服三九日三以知為度忌生葱海藻松菜等物

又療肺傷欬唾膿血腸溫背氣不欲食惡風目闇瞋瞋足膝腰寒湯方 乾地黄切半 桑白皮切二 芎藭

切一 白膠兩五 桂心二 人參 紫苑各二分 大棗二十 生薑兩五 飴糖 大麻仁各一分 大麥升三 右十二味切

以水一斗五升煮麥濾取一斗去滓內藥煎取三升分三服忌生葱

又療肺病欬嗽膿血及唾涕血出不止方 好酥五十斤 右三遍鍊停凝當出醍醐服一合日三以差止

又方 三遍鍊酥如雞子黃通寒溫灌鼻中日二夜一

又療欬嗽喘息喉中如有物唾血方 杏仁二升去尖 猪脂二升 糖一升 薑汁二升 蜜升 右五味先以猪膏

煎杏仁黃黑出以紙拭令淨搗如膏合煎五物令可丸服如杏核日夜六七漸加之並出第十卷中

古今錄驗瀉肺湯療肺中懷痰唾血氣急不安卧方 芩藎 麻黃去心 細辛 椒去目 當歸各一 右

五味切以水七升煮取三升分為三服日三服汗或吐膿血忌生菜一方有生

又羊肺湯療痰晝夜無間氣欲絕肺傷唾血方 鍾乳五兩 牡蠣熬 桂心六兩 射干 桃仁去尖 貝母 橘

皮 百部根 五味子各三升 生薑六兩 白石脂 半夏洗 款冬花 甘草炙 厚朴炙 兩羊肺具 右十

六味切先以水二斗三升煮羊肺取一斗去肺內諸藥煮取三升分四服日三夜一忌海藻松菜羊肉

錫生葱出第十

久嗽嗽膿血方四首

病源久嗽嗽膿血者肺感於寒微則成嗽嗽效極甚傷於經絡血液凝結故有膿血氣血俱傷故連滯

積久其血黯瘀與膿相雜而出也此第十

廣濟療積年嗽嗽膿血方 芎藭升二 大棗一百顆 右二味以水三大升取馬薤燒火煎熟之候令汁盡

取棗早晨服一枚日中一枚日暮一枚不覺漸加口乾胸熱則以為度不吐不利忌並如前法

又療嗽經年不差氣喘欲絕傷肺見血方 桑白皮切 五 白羊肺切 具芍藥十 款冬花六 茯苓一 貝母

分十二 麥門冬 杏仁去尖皮熬 升麻分二 生地黃汁升一 黃芩分二 蜜升 右十二味切以水一斗煮

取三升去滓內杏仁脂地黃汁蜜等微火上煎如魚眼沸攪勿停手取二升二合煎成淨綿夾布濾每

食後含一合日夜三四度老小以意減之微煖含之佳忌生冷油醋鈔魚蒜薑菜並出第

除師療嗽逆氣喘不息不得眠唾血嘔血短氣連年款冬花丸方 款冬花分八 紫苑分二 杏仁八分 去

仁者 香鼓十分 人參分二 甘草炙 蜀椒汗各 天門冬六分 乾薑 桂心 乾地黄各三 右十一味搗師

蜜和如彈丸含稍稍嚥汁日四夜再神良忌海藻松菜生葱薑薤鯉魚出第十

近效療久嗽兼唾血方 白前三 桑白皮 桔梗各二 甘草炙 一兩 右四味切以水二大升煮取半大升

空腹頓服若重者十數劑忌猪肉海藻松菜到方

欬嗽唾粘方二首

廣濟療肺熱欬嗽涕唾多粘甘草飲子方 甘草六分 欬冬夜心 欬心合生 麥門冬八分 白梧欬 欬柳十

合子 梧梗欬 地黃汁并

右八味切以水六升煮取二升絞去滓下地黃汁分溫三服如人行四五里

進一服不利忌生菜麪炙肉海藻松菜魚蒜粘食猪肉蕪荑出第二

延年紫蘇飲療欬嗽短氣唾涕稠喘乏風虛損煩發無時者宜服此方 紫蘇 貝母各二 紫苑 麥門

冬去心各 紫苑五枚 草薢子欬令黃 甘草一兩

右七味切以水六升煮取二升分為四服每服如人行

七里禁猪魚肉蒜海藻松菜此第五

許仁則療欬嗽方一十二首

許仁則論欬嗽病有數種有熱嗽有冷嗽有肺氣嗽有飲氣嗽熱嗽者年少力壯體氣充滿將息傷熱積

熱所成故致熱嗽此但食飲取冷兼以藥壓之自敗冷嗽者年衰力弱體氣虛微如復寢食傷冷故成冷

嗽此亦但將息以溫兼進溫藥則當平復肺氣嗽者不限老少宿多上熱後因飲食將息傷熱則常嗽不

斷積年累歲肺氣衰便成氣嗽此嗽不早療遂成肺痿若此將成多不救矣飲氣嗽者由所飲之物停滯

在胸水氣上衝衝入於肺肺得此氣便成嗽久而不除漸成水氣若作此病亦難療之熱嗽之狀更無其

餘但遇於熱便發此者宜合生地黃等七味湯服之方 生地黃一升 生薑二合 桑白皮根切一 射干切

升乾葛切六 紫蘇合 竹瀝升 右藥細切七味以水一斗煮取三升去滓內竹瀝攪調每食後良久則

服之分一劑作四服若覺可則重合服之病輕者三數劑則差忌蕪荑

又依前生地黃等七味飲雖得暫差於後還發宜合紫苑等十味丸方 紫苑五 桑白皮合六 射干四 百部

根五 麻黃二兩 乾葛五兩 地骨皮 升麻各四 乾地黃 芒硝各六

右藥搗篩蜜和丸如梧子以竹瀝

下之初服十五丸日再服稍稍加至三十丸忌蕪荑

又冷嗽之狀但遇諸冷此疾便發有如此者宜合大棗等七味湯主之方 大乾薑三十 桂心四 杏仁百

入宋本作
尚德按桑
白皮根疑
當作桑根
白皮

救去六皮兩仁研 細辛兩 吳茱萸當歸各三 右藥切以水八升煮取二升六合去滓溫分三服每服如人

行十里久服一劑覺得力至三四劑亦佳隔三四日服一劑此湯元欠一味忌生葱生菜

又依前大乾薑湯服之雖可未能斷其根過冷便登宜合當歸等十味丸服之方當歸切細辛甘草

吳茱萸 人參各三 劉椒三合 橘皮 乾薑各四 桑白皮八兩 右藥搗篩蜜和丸煮乾棗

飲下之初服十丸日再服稍加至三十丸如梧子服此丸經三五日覺熱每服藥後良久喫三數口粥

食鹽之忌海藻松菜生葱生菜

又肺氣嗽經久將成肺痿其狀不限四時冷熱晝夜嗽常不斷唾白如雪細沫稠粘喘息氣上乍寒乍熱

發作有時唇口喉舌乾焦亦有時唾血者漸覺瘦悴小便赤顏色青白毛聳此亦成蒸有此狀者宜合白

前等七味湯服之兼有麻黃等十味丸桑白皮等十味煎

又肺氣嗽經久有成肺癰者其狀與前肺痿不多異但唾涎成膿出無多少有此病者於白前湯中加半

夏五兩黃耆三兩以水一斗煮取二升八合於麻黃丸中加黃耆五兩苦參六兩芍藥三兩於桑白皮煎

中加黃耆切三升共桑白皮地骨皮同煎又加水三升同煎忌羊肉鰾

白前湯方 白前 桑白皮各三兩 生地黃升 茯苓兩 地骨皮兩 麻黃去節生薑 右藥切以水八升煮

取二升六合去滓加竹瀝五合分溫四服食後服之晝三夜一覺得力重合服五六劑佳隔三日服一

劑忌醋蕪荑

又依前白前等七味湯雖服覺可根本未除宜合麻黃等十味丸服之方 麻黃去節 白前各二兩 桑白皮六兩

射干兩 白薇三兩 百部根兩 乾地黃六兩 地骨皮五兩 橘皮三兩 右藥搗篩蜜和丸煮桑白皮飲下之初服十

丸日再服稍加至十五丸如梧子大本欠一味忌蕪荑

又凡病在胸膈上者宜飽滿而在夜肺既居上此是病在上已晝服丸夜無憑準宜合桑白皮汁等十味

前每夜含咽之方 桑白皮切 地骨皮切 三 二味用水七升熟煎取三升汁去滓澄清 生地黃汁

五生麥門冬汁二升生薑汁一升竹瀝生葛根汁各三升白蜜并牛酥各三升大棗膏升一右八味先於微火上取生地黃汁以下生葛汁以上和煎減半則內桑白皮等二物汁和煎之三分減一則內酥蜜棗膏等之勿停手得知稠飴狀煎成訖置利器中服之每夜欲卧時取一胡桃大含之細細嚥汁稍加至雞子大欲盡日間丸服亦得忌蘊菜

又飲氣嗽經久不已漸成水病其狀亦不限四時晝夜嗽不斷遇諸動嗽物便致困劇甚者乃至雙眼突出氣即欲斷汗出大小便不利吐痰飲涎沫無復窮限氣上喘急肩息每旦服腫不得平眠有如此者宜合細辛等八味湯葶藶子十五味丸服之方細辛半斤洗桂心桑白皮各五兩當歸各四兩芒硝六兩杏仁六合去尖右藥切以水九升煮取三升去滓內芒硝分溫三服每服如人行十里久當得快利後好將息經三四日合丸服之忌生葱生菜羊肉錫

丸方葶藶子六合細辛五味子各五兩乾薑當歸各四兩桂心人參丁香大黃商陸根各三兩橘皮四兩桑白皮六兩炙肉二兩大腹檳榔二十枚麻黃去節二兩右藥搗篩蜜和丸煮桑白皮飲下初服十丸日再服稍加至十五丸如梧子大若利則減秘則加以大便通滑為度時時得鴨澹亦佳忌生葱生菜

又依前細辛等八味湯葶藶子等十五味丸不覺可漸成水病餘一如前況更加大小便秘澀頭面身體浮腫宜合大戟棗三味丸服之方大棗六十枚葶藶子煮杏仁去皮各一兩右藥合搗令如膏可作丸如硬燥不相著細細下蜜作丸依前以桑白皮飲下之初服七八丸日再服稍稍加之以大便秘為度病重者時令鴨澹佳亦有以前三味煮湯服之

又依前大棗等三味丸服雖覺氣數歇然病根深固藥力微弱且停服大棗丸合巴豆丸五味細細服之蕩滌宿病方巴豆仁二十枚杏仁一百顆大黃五合葶藶子六合大棗六十枚右藥合搗一如前大棗丸法還以桑白皮飲下之服三四丸日再服如利即減秘即加常以大便調為候病其時時

取鴨湯亦佳忌蘆笋野猪肉吳并同出下卷中

雜療效嗽方三首

古今錄驗五藏六腑皆令人欬肺居外而近上合於皮毛皮毛喜受邪故肺獨易為嗽也邪客於肺則寒熱上氣喘汗出欬動肩背喉鳴甚者唾血肺欬經久不已傳入大腸其狀欬則遺糞腎欬者其狀引腰背痛甚則欬逆腎欬經久不已傳入膀胱其狀欬則遺尿肝欬者其狀左脇痛甚者不得轉側肝欬經久不已傳入膽其狀欬則清苦汁出心欬者其狀引心痛喉中介介如鯁狀甚者喉痺咽腫心欬經久不已傳入小腸其狀欬則失氣脾欬者其狀右脇痛陰陰則引肩背甚者不得動動便欬劇脾欬經久不已則傳入胃其狀欬即嘔甚則長蟲出久欬不已則三焦受之三焦欬之狀欬而腹滿不能食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也又非時有風寒冷人觸冒解脫傷皮毛間入腑臟為欬上氣如此也又非時忽發暴寒傷皮膚中與肺合則欬嗽上氣或胸脇又痛欬啞有血者是其熱得非時之寒暴薄之不得漸散伏結深吾肺癰也因欬服溫藥欬尤劇及壯熱吐膿血汗出惡寒是也天有非時寒者急看四時方也

又療欬嗽上氣時時嘔白唾沫數十歲者方 吳茱萸 五味子 大黃 桂心 甘草炙 細辛 人參

紫苑款冬花 各一大戟 竹茹各三 右十一味切以水一斗煮取三升分為三服亦療陰冷欬至

良忌海藥松葉生葉生葱深師同並出第十九卷中

深師療諸欬心中逆氣氣欲絕杏仁煎方 杏仁四兩去皮末 猪膏斤 白蜜二升 薑汁三升 右四味著銅器中

於微火上先煎薑汁次內蜜膏令如飴置器著地乃內杏仁末復令得一沸煎成服如棗大一丸含之

日三不知稍增之

又療氣上迫滿或氣不通煩悶喘嘔蘇子湯方 蘇子升 乾薑三升 半夏四兩 桂心 人參各一 橘皮 茯苓

各三甘草一兩 右八味切以水八升煮取二升半分為三服若虛熱去乾薑用生薑六兩加黃芩

分
卷九
二兩忌海菜松菜羊肉錫生葱酢等物並出第十卷中

外臺秘要卷九終

尚德按今
有方八首

尚德按今
有方二首

尚德按八
數當作七

唐王素先生外臺祕要方卷十目錄

肺痿肺氣上氣
欬二十八門

肺痿方一十首

肺氣客熱方二首

肺熱兼欬方七首

肺虛寒方三首

肺氣不足口如含霜雪方四首

肺脹上氣方四首

肺氣積聚方二首

肺癰方九首

大腸論二首

大腸熱實方三首

大腸虛寒方三首

皮虛實方二首

上氣方九首

卒上氣方六首

久上氣方四首

上氣胸滿方二首

上氣欬身面腫滿方四首

上氣喉中水雞鳴方一十二首

因食飲水上氣方四首

卒短氣方四首

上氣及氣逆急牽絕不得卧方八首

欬嗽上氣方八首

欬逆上氣嘔吐方四首

上氣欬嗽多唾方三首

上氣欬方一首

久欬嗽上氣方三首

欬逆上氣方五首

雜療上氣欬嗽方四首



唐王壽先生外臺秘要方卷十

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程行道敬通父訂梓

男龍錫為光父全校

肺痿方一十首

千金論曰寸口脈數其人病欬口中反有濁唾涎沫出何也師曰此為肺痿之病肺痿之病何從得之師曰病熱在上焦因欬為肺痿或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難被駛藥下利重亡津液故得肺痿又寸口脈不出而反發汗陽脈早索陰脈不澀三焦竭入而不出身體反冷其內反煩多唾唇燥小便反難此為肺痿傷於津液便如爛瓜亦如豚腦但坐發汗故也其病欬欬不得欬欬則出乾沫久久小便不利甚則脈浮弱肺痿吐涎沫而不效者其人不渴必道溺小便數所以然者上虛不能制下故也此為肺中冷必眩師曰肺痿欬唾咽燥欲飲水者自愈自張口者短氣也

仲景傷寒論療肺痿吐涎唾不效者其人不渴必道溺小便數所以然者以上虛不能制下故也此為肺冷必眩甘草乾薑湯主之以溫其臟方甘草乾薑湯右二味切以水三升煮取一升半分溫二

服服湯已小溫覆之若渴者屬消渴忌海藻松菜

又療肺痿涎唾多心中溫溫液者炙甘草湯方甘草炙四兩生薑三兩去皮人參兩二兩地黃一斤阿膠三兩大麻

子仁斤大棗四十麥門冬半斤桂心二兩右九味切以美酒七升水八升相和先煮八味取四升絞去

滓內膠上微火烱銷溫服七合日三夜一

時後療肺痿欬吐涎沫心中溫溫咽燥而渴者方生天門冬去心酒各一升

右四味合銅器中於湯上煎可丸服如杏仁一丸日三忌鯉魚

集驗療肺痿欬吐涎沫不止咽燥而渴方生薑兩五兩人參兩三升甘草二兩大棗十二枚右四味切以水

五升者取一升半分丹服忌海藻松菜注千金經心錄同

又療肺痿欬嗽涎沫心中溫溫咽燥而渴方不渴生薑甘草大棗十二枚右三味切以水五升

煮取一升半分再服一方乾薑三兩代生薑忌海藻松菜注千金經心錄同

又療肺痿時寒熱兩頰赤氣急方童子小便每日晚取之去初末少許小便可有五合取上好甘草

量病人中指節男左女右長短截之炙令熟破作四片內小便中直於閑淨處露一宿器上橫一小刀

明日平旦去甘草頓服之每日一劑其童子勿令喫五辛海藻松菜注千金經心錄同

刪繁療虛寒喘鳴多飲逆氣嘔吐半夏肺痿湯方牛夏湯注千金經心錄同母薑一兩橘皮一斤白朮兩桂心兩

切以水九升煮取三升去滓分溫三服忌羊肉鴿桃李雀肉生葱注千金經心錄同右五味

又療凡虛寒肺痿喘氣乾地黃煎方乾地黃兩桑根白皮注千金經心錄同芍藥兩桂心人參兩三

右六味切以水九升先煮五味取三升去滓內大麻仁煎數沸分三服忌生葱薑注千金經心錄同

千金療肺痿涎唾多出心中溫溫液液甘草湯方甘草注千金經心錄同右一味切以水三升煮取一升半分溫

三服忌海藻松菜注千金經心錄同

又療肺痿吐涎沫桂枝去芍藥加皂莢湯方桂心三甘草注千金經心錄同大皂莢一兩注千金經心錄同生薑三兩

五味切以水七升微火煮取三升分三服忌生葱海藻松菜注千金經心錄同

肺氣客熱方二首

延年百部根飲主肺氣客熱暴傷風寒因嗽不安方百部根注千金經心錄同一兩天門冬注千金經心錄同紫苑一兩

葛白前橘皮注千金經心錄同生薑注千金經心錄同白切注千金經心錄同右十味切以水六升煮取一升七合去滓分溫三服

疎數任情飲可分為四服欲開食亦得禁生冷鯉魚蒜注千金經心錄同

古今錄驗療肺客熱并肝心客氣人參湯方桂心甘草注千金經心錄同人參乾薑防風注千金經心錄同白朮注千金經心錄同

右六味切以水八升煮取三升分三服日三宜溫忌桃李雀肉生葱海藻松菜注千金經心錄同

尚德按出字下千金有血字

尚德按今有六八首

尚德按一斗千金作一斗五升

尚德按熱實千金作實熱下同

尚德按卷門冬下疑脫汗字

肺熱兼效方七首

荆繁療肺熱氣上致急奔喘橘皮湯方

橘皮

杏仁各四兩去尖皮柴胡

麻黃去節各三兩

乾蘇葉二兩母薑四兩去尖

石膏八兩

右七味切以水九升先煮麻黃兩沸除沫下諸藥煮取三升去滓分三服不差再服

金云商

第十金同出第五卷中

千金療肺熱悶不止胸中喘急驚悸客熱來去欲死不堪服藥泄胸中喘氣方

桃皮 芫花各一

右

二味以水四斗煮取一斗去滓以故布手巾內汁中薄胸溫四肢不盈數日即歇

又凡右手寸口氣口以前脈陰實者手太陰經也病苦肺脹汗出若露上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀石肺熱實也

又療肺熱實胸悶仰息泄氣除熱湯方

兩赤蜜合七右七味切以水七升煮取二升去滓下蜜更煮兩三沸分三服忌桃李雀肉等

枸杞根皮升二白前三兩石膏八兩碎

杏仁三兩去尖皮研橘皮

白朮五

又療肺熱言音喘息短氣好唾膿血方

生地黄升二石膏八兩淡竹茹如雞子大一枚杏仁四兩去尖皮研羚羊角屑芒硝各三

亦蜜升一麻黃五兩升麻三兩

右九味以水七升煮取二升去滓下蜜煮兩沸分三服忌蕪荑

第出

卷十七

延年天門冬煎主肺熱兼效聲不出方

生天門冬升一橘皮二兩生地黄升二白蜜合五牛酥合三白糖五兩杏仁升一貝母升一紫苑通草各三百部根

白前 甘草炙人參各二

右十四味切以水六升煮

貝母等藥取二升五合去滓內天門冬地黃汁煎可減半內酥蜜生薑等煎令可丸稍強取如雞子黃

大含嚙之日四五度忌鯉魚蕪荑海藻松菜等依文仲處

又地黃麥門冬煎主肺熱兼效方

生地黄汁 生麥門冬各三生薑汁合一白蜜各二右五味先煎地黃麥門冬薑汁等三分可減一分內酥蜜煎如稀餡內貝母末八分紫苑末四分攪令調一服一

是日二服夜一服忌蕪荑

肺熱兼效方七首

肺虛寒方三首

二

又天門冬煎主肺間熱欬咽喉塞方

天門冬三兩去心冬二兩去心款冬花

貝母各一兩紫苑各一兩茯苓各一兩升

麻各二生薑升三蜜升一酥合地黃升三

右十一味切以水八升煮七物取一升去滓內生薑地黃汁

煮取一升內蜜酥於銀器中加湯上煎令成丸一服如彈丸一枚含嚥日夜三五丸忌醋物蕪羹鯉魚

等類仁

又羚羊角飲主肺熱胸背痛時時乾欬不能食方

羚羊角二兩貝母

生薑各一兩茯苓各一兩橘皮各一兩人參

芍藥各二兩

右七味切以水五升煮取一升八合去滓分溫三服每服如人行八九里久更服禁生冷

蒜鉤醋五卷中

肺虛寒方三首

刪繁療肺虛寒癰風所傷聲音嘶塞氣急喘噎欬唾蜜膏酒止氣欬通聲方

酥崖蜜飴糖生

薑生百部汁大棗肉研為杏仁去皮甘草五具

右八味合和微火煎常攪三上三下約一炊久薑

汁并百部汁各減半停下溫清酒一升服方寸匕細細嚥之日夜三

皮即金桐皮亦有與甘草並用者干

甘草用之云去脂又云甘草子皮亦可見其非

千金療肺虛寒癰風傷語音嘶塞氣急喘噎欬唾方

猪脰具三大棗去核好酒升五

右三味以酒漬二

味秋冬七日春夏三日生布絞去滓二七日服盡忌鹽無猪脰以羊脰代同出後張文仲備急

又凡右手寸口氣口以前脈陰虛者手太陰經也病苦少氣不足以息噤乾不津液病名曰肺虛寒也

又療肺虛寒則聲嘶傷語言用力戰掉緩弱虛瘠風入肺防風散方

防風獨活芎藭秦椒秦椒汗黃

者附子乾薑石膏研天雄炮甘草炙山茱萸麻黃五味子各六秦艽桂心山藥

杜仲人參防己各五黃芩各五紫苑各五細辛當歸各五

方寸匕日再忌海藻菰菜猪肉冷水生葱生菜

肺氣不足口如含霜雪方四首

通按本卷小紫苑丸內甘草一作甘草但不知五耳來何說耳尚德按五猶第三十卷中云石櫛皮一具之類尚德按千金云夏服五日又云七日盡服二七日忌鹽

廣濟療肺氣不足寒從背起口如含霜雪語無聲音劇者吐血苦寒五味子湯方 五味子三兩大棗十二

桑根白皮升薑二兩鍾乳三兩款冬花雞蘇各二兩右七味切以水九升煮取三升分溫三服每服如

人行七八里進一服忌猪魚炙肉麪陳臭等物此方甚良

又療肺氣不足逆氣胸滿上迫咽喉開塞短氣連唾相屬寒從背起口如含霜雪語無聲音劇者唾血腥

臭或歌或哭乾嘔心煩耳聞風雨聲皮毛悴面白紫宛湯方 紫宛 五味子 生薑拾皮白石英研綿

款冬花 桂心 人參各二兩鍾乳研綿麥門冬去心桑根白皮各三兩大棗拾粳米合右十二味切水

一斗五升先煮桑根白皮粳米取九升去滓內諸藥煎取三升去滓分溫三服每服相去如人行七八

里久忌生葱麪炙肉深師千金與紫宛人參並出第二卷中

深師療肺氣不足逆滿上氣咽喉中閉塞短氣寒從背起口中如含霜雪語言失聲甚者吐血補肺湯方

五味子三兩乾薑 款冬花各二兩桂心一兩麥門冬去心大棗拾粳米二合桑根白皮一斤右八味切以水

一斗二升先煮薑并桑白皮粳米五沸後內諸藥煮取三升分三服忌生葱十金同出第八卷中

集驗補肺湯療肺氣不足欬逆短氣寒從背起口中如含霜雪語無音聲而渴舌本乾燥方 五味子

白石英研綿鍾乳同桂心 橘皮 桑根白皮各三兩粳米合茯苓 竹葉 款冬花 紫宛各二兩大棗

五十枚杏仁五十枚蘇子半升生薑五兩麥門冬去心右十六味切以水一斗三升先煮桑白皮薑粳米

熟去滓內諸藥煮取四升分三服日再夜一忌大酢生葱十金同出第四卷中

肺脹上氣方四首 五法

廣濟療患肺脹氣急欬嗽喘滿眠卧不得極重惡氣欲絕紫宛湯方 紫宛六分甘草八分檳榔七枚茯苓八

葶藶子三合右五味切以水六升者取二升半絞去滓分溫三服每服如人行四五里久進之

以快利為度忌生葱菜鮑海藻松菜大醋蒜粘食出第二卷中

仲景傷寒論肺脹者欬而上氣煩躁而喘脈浮者以心下有水宜服小青龍湯加石膏主之方 麻黃三兩

尚德按要
略石膏二

尚德按要
略煮取三

尚德按要
略煮取三

尚德按要
略煮取三

尚德按要
略煮取三

尚德按要
略煮取三

尚德按要
略煮取三

尚德按要
略煮取三

尚德按要
略煮取三

尚德按要
略煮取三

尚德按要
略煮取三

尚德按要
略煮取三

尚德按要
略煮取三

尚德按要
略煮取三

尚德按要
略煮取三

尚德按要
略煮取三

尚德按要
略煮取三

去五味子升半石膏升乾薑升芍藥升細辛升桂心升甘草升半夏升右九味切以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服強人一升瘦人及老小以意減之日三夜一忌生葱生菜海藻松菜羊肉錫等

又肺脹者病人喘目如脫狀脈浮大也肺脹而欬者越婢加半夏湯主之方大棗升麻黃升石膏升甘草升芍藥升浮萍升生薑升右六味切以水六升先煮麻黃三沸去沫內諸藥煮取二升去滓

溫服八合日三不知更作之忌海藻松菜羊肉錫等並出第十卷中

深師療欬而上氣肺脹其脈浮心下有水氣小青龍加石膏二兩設若有實者必躁其人常倚伏小青龍湯方用前仲景方

千金療肺脹欬嗽上氣咽燥脈浮心下有水麻黃湯方麻黃升芍藥升生薑升細辛升桂心升半夏升石膏升五味子升右八味切以水一斗煮取三升分三服忌生葱羊肉錫生菜集驗同出第十七卷

中肺氣積聚方二首

救急療肺氣積聚心肋下滿急發即欬逆上氣方麻黃升杏仁升柴胡升生薑升半夏升葶藶子升乾薑升枳實升右八味切以水一斗煮取二升八合去滓分溫三服每服相去如人行八九里久七日忌食生冷猪魚羊肉此方服一劑訖將息滿七日則服後方忌羊肉錫

又方茯苓升乾蘇升橘皮升麻黃升杏仁升生薑升右七味切以水一斗煮取二升七合去滓分溫三服每服如人行八九里久禁酢物蒜麴猪肉五日服一劑並出第六卷中

肺癰方九首

千金論曰病欬唾其脈數實者屬肺癰虛者屬肺痿欬而口中自有津液舌上胎滑此為浮寒非肺痿也若口中辟辟燥欬即胸中隱隱痛脈反滑數此為肺癰也問曰病者欬逆師脈之何以知此為肺癰當有

尚德按此
證要略用
下二味結
梗易結梗
寒胸膈寒
胃結胸無
天散者
尚德按要
略結梗一
兩

尚德按千
金草庵三
兩要略大
素十二枚
又按千金
內藥一匙
大煎取七
合外臺蓋
據要

膿血吐之則死後終吐膿死其脈何類何以別之師曰寸口脈微而數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脈風舍於肺其人則吸口乾喘滿咽燥不渴唾而濁沫時時振寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌可救膿成則難治寸口脈數跌陽脈緊寒熱相搏故振寒而致跌陽脈平緩胃氣如經此為肺癰跌陽脈浮緩少陰微緊微為血虛緊為微寒此為鼠乳其病屬肺也問曰振寒發熱寸口脈滑而數其人飲食起居如故此為癰腫病醫反不知而以傷寒治之應不愈也何以知有膿膿之所在何以別知其處師曰假令在胸中者為肺癰其脈數欲唾設膿未成其脈自緊數緊去但數膿為已成也出第十卷中

仲景傷寒論欲胸中滿而振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥者肺癰也桔梗白散主之方 桔梗 貝母各三 巴豆一分去皮心 右三味搗篩強人飲服半錢匕臈人減之若病在膈上

者必吐膈下者必利若利不止者飲冷水一杯則定忌猪肉蘆葦等出第十卷中 集驗療胸中滿而振寒脈數咽燥而不渴時時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥是為肺癰桔梗湯方

桔梗二兩千金古今甘草二兩 右二味切以水三升煮取一升分再服朝暮吐膿血則差金匱要略古

千金療效有微熱煩滿胸中甲錯是為肺癰黃昏湯方 黃昏手掌大一枚即合微木皮 右一味切以水三升煮得

一升分再服同注 又肺癰喘不得卧葶藶大棗湯肺湯主之東療胸脇脹滿一身面目浮腫鼻塞涕出不聞香臭酸辛效

逆上氣喘喘迫塞方 葶藶三枚令色紫 右一味搗令可丸以水三升煮壁大棗二十枚得汁二升內藥如

彈丸一枚煎取一升頓服古今雜驗淵源仲景傷寒論 備急療腸癰肺癰方 升麻 白欬 漏蘆 芒硝各一 黃芩 枳實炙 連翹 蛇銜各三 梔子二十 薊 蘆根兩 右十味搗令細以水三升清經半日以猪脂五升煎令水竭去滓傅之日三若交急合水前

出第四

古今錄驗療肺癰方 薤白仁升醇苦酒升 右二味煮取一升溫令頓服有膿血當吐范汪經

又療肺癰葦莖湯方 剉葦升薤白仁升桃仁五十枚去尖瓜瓣升 右四味以水一斗先煮葦令

得五升去滓悉內諸藥煮取二升分再服當吐如膿仲景云葦莖切二升千金范汪同

又療肺癰經時不差桔梗湯方 桔梗半白朮二兩當歸兩地黃兩甘草二兩敗醬 薤白仁兩桑白皮升

切 右八味切以水一斗五升煮大豆四升取七升汁去豆內清酒三升合諸藥煮之取三升去滓服

六合日三夜再忌豬肉燕羹桃李雀肉海藻松菜等

又療肺癰生地黄汁湯方 生地黄汁升當歸 甘草炙白石英各一兩人參各一兩附子二分白小豆三十

雞一頭如男用雞女用雞療 右八味切以水一斗五升煮雞取七升汁去滓內地黃汁諸藥等取三

升去滓分服六合日三夜二忌蕪荑海藻蔞菜冷水猪肉等並出第二十一卷中

大腸論二首

千金論曰大腸腑者主肺也鼻柱中央以為候也肺所以合氣於大腸者大腸為行道傳瀉之腑也號監

倉樣重二斤十二兩長一丈二尺廣六寸臍右迴疊積還反十二曲肚水穀一斗二升主十二時定血脈

和利精神又曰肺前受病移於大腸肺氣不已則大腸受之大腸氣則遺失便利肺應皮皮厚即大腸厚

皮薄即大腸薄皮緩腹大者大腸緩而長度急者大腸急而短皮滑者大腸直皮肉不相離者大腸結

又扁鵲云大腸絕不療何以知之洩痢無度則絕則死實即腸熱熱則脹滿不通口為生瘡食下入腸則

腸實而胃虛下胃則胃實而腸虛所以實而不滿乍實乍虛乍來乍去虛則傷寒寒則腸中雷鳴洩青白

之痢而發於氣水根在大腸大腸有寒瘕湯有熱便腸垢大腸有宿食寒懷發熱有時如瘧狀大腸病者

腸中切痛而鳴漉漉冬日重感於寒則洩當臍而痛不能久立與胃同候腸中雷鳴氣上衝胸喘不能久

尚德按
疑當作治

尚德按
有取字

立邪在大腸也大腸脹鳴而痛腸寒即洩食不化

出第十卷中

大腸熱實方三首

千金凡右手寸口氣口以前脈陽實者手陽明經也痛苦腸滿善喘效面赤身熱喉咽中如核狀名曰大腸實熱也

又療大腸實熱腹脹不通口為生瘡生薑瀉腸湯方 生薑 橘皮 青竹茹 白朮 黃芩 梔子

兩桂心一兩生地黃兩黃芩芒硝各二兩大棗十四枚 右十一味切以水七升煮取三升去滓下芒硝分

三服忌生葱蘆薤海藻松菜醋物桃李雀肉等

出第十卷中

刪繁療肺脈厥逆大於寸口主大腸熱效上氣喘鳴心煩麻黃湯方 麻黃去節芍藥 生薑 半夏

通細辛五味子各三兩桂心兩石膏兩 右八味切以水九升先煮麻黃七八沸去沫次下諸藥煎取

三升去滓分三服忌羊肉錫生葱生菜等

又療大腸熱甚脇滿掌中熱淡竹葉飲泄熱氣方 淡竹葉切 橘皮 乾蘇葉 白朮 甘草

蔥白切一桂心一石膏兩杏仁六十枚 右九味切以水一斗二升先煮竹葉取一斗去滓澄清

取九升下諸藥煮取三升絞去滓分三服若須利下內芒硝三兩忌海藻松菜桃李雀肉生葱

並出第十卷中

大腸虛寒方三首

千金凡右手寸口氣口以前脈陽虛者手陽明經也痛苦胸中喘腸鳴虛渴唇乾目急善驚泄白名曰大

腸虛寒也

又療大腸虛寒痢下青白腸中雷鳴相逐黃連補湯方 黃連 茯苓 芍藥 醋石榴皮 地榆

伏龍肝如雞子大 右六味切以水七升煮五味取二升五合去滓下伏龍肝屑攪調分三服忌猪肉冷

水大醋

出第十卷中

刪繁療大腸虛寒久味效氣短少腹中痛款冬花丸方 款冬花 桂心 五味子 乾薑 芍藥

尚德接今
高庚接今
兩酸石榴
皮五片

尚德接今
有方二首

甘草

各五分

附子

炮枯梗各四

蘇子

合

蜀椒

升一百部

汁

合

白蜜

升一

乾棗

五十枚

薑汁

升一

右十四味

細

搗為末

將薑蜜汁和微火上煎取為丸

如梧子每服溫酒下三十九丸

加至四十九丸

日再服

忌海藻松菜

諸

肉冷水生葱

出第二卷中

皮虛實方二百

刪繁論曰

夫五臟六腑者內應骨髓外合皮毛

若病從外生則皮毛膚肉若病從內發則骨髓疼痛

陰陽表裏外皮內髓其病源不可不詳之也

皮虛者寒皮實者熱

凡皮虛實之應主于肺大

腸其病發於皮毛熱即應藏寒即應肺

第十卷中

千金瘡皮虛主大腸病寒氣關格萌蘗蒸湯方

萌蘗根

切

桃皮

葉

葛蒲

各分三

細糠

斗

秫米

升五

右五味

以水一石五斗煮取米熟為度

大盆器貯於上作小竹牀子罩盆

人身坐牀中四面周迴將席

薦障風身上以衣被蓋覆若氣急時開孔對口洩氣取通身接汗可作兩食久許如此三日若盆裏不

過熱盆下安炭火也非惟療寒但是皮膚下一切勞冷並皆療之

忌羊肉鵠

同紫

又瘡皮實主肺病熱氣梔子煎方

梔子

枳實

炙

大青

杏仁

去兩仁

柴胡

芒硝

各三

生地黃

切一

石膏

八淡竹葉

升切一

生玄參

兩五

右十味切以水九升煮取三升下芒硝分三服

忌蘗

同紫

第十八卷中

上氣方九首

廣濟療上氣方

葶藶子

五合

桑根白皮

切大棗

二十枚

右三味以水四升煮取一升絞去滓內

葶藶子泥如棗大煮之三分減一頓服以快利為度

忌如藥法

出第二卷中

肘後主上氣方

炙從大椎數下行第五節下第六節上空間即灸一處隨年壯祕方

深師千金翼文仲

千金療上氣方

上酥升一

獨頭蒜

五兩

生薑汁

合

右三味同煎使熟空腹服一寸七溫服

之忌麴

又方

芥子

升

右一味末之蜜和為丸寅時井華水服如梧子七丸日二服散亦佳禁如藥法尤忌油

尚德按千金
金匱要略
切二升
葉枝到
二升
又按千金
三日下云
寒還溫藥
足汁用之
尚德按三
千金作二

麴等並出第十卷中

必效療上氣方 半夏洗 茯苓各四兩 橘皮 白朮各三兩 生薑五兩 檳榔十兩 右六味切以水一斗漬一宿煮

取二升七合分三服更加 甘草兩三 人參 前胡各二兩 紫蘇一兩 忌羊肉錫桃李雀肉醋物卷中

古今錄驗溫中湯療上氣方 甘草三兩 桂心四兩 生薑一斤 右三味切以水七升半煎取三升分五服忌

生葱海藻松菜

又昆布丸療胸滿上氣方 大黃 硝石 海藻洗 水銀各一兩 昆布洗三兩 苦瓠辨四枚 葶藶半升 通草二分

桃仁五十枚 右九味搗師以蜜和為丸如梧子許先食服三九日再服

又已試鯉魚湯療上氣方 杏仁熟 貝母 桂心各三兩 橘皮 人參 甘草炙 厚朴炙 麻黃去節 茯苓 胡

麻 白前各二兩 鯉魚五斤 生薑六兩 半夏洗五兩 右十四味切先以水二斗煮魚得一斗二升去魚肉藥煎

取三升二合分四服日三夜一忌海藻松菜醋物羊肉錫生葱等物

又上氣二物散本司馬大將軍方 麻黃一斤 杏仁一百枚 右藥各別搗合和下師為散上氣發時服方寸匕可至

三方寸匕以氣下為候不必常服本師療上氣東飲范注同並出第十九卷中

卒上氣方六首

深師療卒上氣胸心滿塞半夏蘇子湯方 半夏洗五兩 蘇子升 生薑五兩 大棗四十枚 橘皮 桂心各三兩 甘草

二 右七味切水七升煮取二升七合分三服氣即下忌海藻松菜羊肉錫生葱

又療卒急上氣胸心滿竹篠下氣湯方 生甘竹篠口 石膏一兩 生薑 橘皮 甘草炙各三兩 右五味

切以水七升煮竹篠取四升半去滓內諸藥煮取二升分二服此方療急上氣不止者服兩三劑差忌

海藻松菜並出第十卷中

備急萬氏療卒上氣鳴息便欲絕方 桑根白皮切三升 生薑切半升 吳茱萸升半 右三味切以酒五升煮三

沸去滓盡令服之入口則愈千金方

十卷上卷中

尚德按出
字上疑欠
通接拾針
二字可疑
尚德按性
頻引藥性
論云云
亦何軍用
生龍萬
見龍拾針
狂亂觀此
語則拾針
者蓋謂春
連據林如
拾針狀也

又方 麻黃^去甘草^{二兩} 右二味切以水三升煮取一升半分三服古今錄驗用水八升煮取三升八

合忌海藻松葉差後欲令不發者更取二味并熬杏仁五十枚搗篩蜜和丸服四五丸日三^{文仲}後

又療卒上氣氣不復報肩息方 乾薑^{三兩} 右一味以酒一斗清服一升日三服

又方 麻黃^{三兩}桂心 甘草^{一兩}杏仁^{如法} 右四味切以水六升煮取二升分三服此二方名小投

杯湯有氣疾者亦可為散將服之冷多加乾薑三兩淡唾者加半夏三兩忌海藻松葉生葱^{出第三}

久上氣方四首

千金療積年上氣不差垂死者方 莖蒼子^{熟令}熟羊肺^{海切暴} 右二味各別搗等分以七月七日神

醉拌令相著夜不食空肚服二方寸匕須臾拾針兩食間以冷漿白粥二口止之隔日一服永差三十

日內得煮飯汁作燕膏羹食之以外一切禁斷^{文仲}肘

又療上氣三十年不差方 大棗^{一百枚}豉^{一百二}杏仁^{一百}椒^{二百} 右四味先搗杏仁令極熟後內

棗椒豉更搗作丸如棗核大含稍稍嚥之日三夜^{並出第十七卷中}尚德按十

近效療久上氣氣急卧不得方 紫蘇葉^兩生薑 麻黃^去杏仁^{各三} 赤茯苓 桑根白皮 葶藶子^各

兩橘皮^{半一兩} 右八味切以水八升先煮麻黃去沫下諸藥和煮取二升七合絞去滓分三服每服如

人行七八里久溫服之畢服後丸

又丸方 葶藶子^{六兩} 右一味搗如泥丸如梧子大每食後以棗飲下十九日二服乾棗十顆擘碎

以水一升煮取五合去滓用下丸甚效

上氣胸滿方二首

古今錄驗胡椒丸療痰上氣胸滿時復嘔沫方 胡椒 葶藶 乾薑^{各三}白朮 桂心 高良薑 人

參 款冬花 紫苑 甘草^{二兩} 右十味搗篩蜜和丸如梧子一服五丸日二服不知增之以知為

度忌生冷醋滑橘魚肉蒜桃李雀肉生葱海藻松葉^{出第十}

救急茯苓人參散治上氣胸滿悶盈心力除謬忘水不霍亂能飲食此方功力諸藥不逮有年四十時因患積痢瀉不能起止形狀如七十老人服此藥兩劑平復如舊久服延年益壽方 茯苓二斤去黑皮

破如棗大清水漬經一日一夜人參七兩甘草切炙牛乳升白沙蜜五升右五味以水五升內甘草

者取二升降甘草澄瀝內茯苓緩火煎令汁欲盡次內白蜜牛乳次內人參緩火煎令汁盡仍攪藥令

調勿許焦成日中暴乾搗篩為散以紙盛之溫乳及蜜湯和喫並得亦不限多少夏月水和當鈔忌海

藻松菜大醋並是大斗大升大秤兩也此方極驗合數劑立效卷中

上氣欬身面腫滿方四首

崔氏療肺熱而欬上氣喘急不得坐卧身面腫不下食消腫下氣止咳立驗方 葶藶子二十分貝母六分杏

仁二分紫苑一分茯苓一分五味子各六分人參一分桑白皮各八分右八味搗篩蜜和丸如梧子一服十丸

日二服甚者夜一服漸漸加至二三十丸煮棗汁送之若腥氣盛者宜服此藥若小便不利者宜服後

方忌酢物

又方 葶藶子二十分杏仁十二分茯苓六分牽牛子八分右四味搗篩蜜和為丸如梧子許每服八丸日再

夜一漸漸加至二十九者煮汁送之大忌酢物

又療上氣欬嗽長引氣不得卧或水腫或退體氣腫或單面腫或足腫並主之方 葶藶子三升右一

味搗篩為散以清酒五升漬之春夏三日秋冬七月初服如胡桃許大日三夜一冬日二夜二量其氣

力取微利為度如患急困者不得待日滿亦可以綿細絞即服其葶藶單莖向上葉端兩角角麤且短

又有一種芍藥草葉近根下作岐生角細長採時必須分別前件六種病狀發動各不同始終至困並

歸於水但人腹中有塊及兩邊皆有者或當心有塊稍肚大者並是水病即此藥必須得好新熟無灰

酒清者始可用經日多者惡不堪用前件病皆是熱服藥唯須慎酒麤生冷雞猪魚肉大困及不得卧

入口則定老少任意量力必須好差平復始可停藥此方神驗服藥如傷多悶亂者作土漿飲即定並出

必效療上氣欬嗽腹滿體腫方 取椒葉三 右一味煮三十沸去滓煎堪作丸如小棗子以竹筒內下

部立愈出第一卷中

上氣喉中水雞鳴方一十二首

深師療久逆上氣胸滿喉中如水雞鳴投杯湯方 小麥一麻黃四兩厚朴五兩石膏如雞子杏仁五合 右五

味以水一斗煮取小麥熟去麥內藥煮取三升分三服欬嗽甚者加五味子半夏洗各半升乾薑三累

經用甚良

又療上氣脈浮欬逆咽喉中水雞鳴喘息不通呼吸欲死麻黃湯方 麻黃八兩射干二兩甘草四兩大棗

三十 右四味切以水一斗先煮麻黃三沸去上沫內諸藥煮取三升分三服已用甚良忌海藻松菜

等

又療欬逆上氣胸中塞不得息卧不安席牽繩而起咽中如水雞聲投杯湯方 款冬花一杏仁四十

甘草二兩大棗二十桂心二兩麻黃四兩生薑半夏三兩洗各紫宛細辛各一 右十味切以水八升煮

取二升頓服之一方分再服令汗出食粥數口勿飽食神良忌海藻松菜羊肉鰯生葱菜

又療欬逆上氣燥嗽冷嗽晝夜甚喉中水雞鳴鍾乳丸方 鍾乳人參桂心乾薑各八附子炮

冬花細辛各六紫宛各十杏仁各四 右九味搗篩蜜和酒服如小豆二九日三不知稍稍加之忌猪肉

冷水生葱生菜等物

又療上氣欬嗽喉中水雞鳴唾膿血腥臭麻黃湯方 麻黃六兩桂心二兩甘草二兩杏仁去尖皮生薑八兩

用乾薑 右五味切以水七升煮取三升半分五服已用療欬唾膿血喉中腥臭得力後長將丸服忌

海藻松菜生葱

又療久欬上氣喉中喘急夜不得卧母散方 貝母三兩麻黃去節乾薑二兩桂心甘草各一炙右五味

搗篩平旦酒服方寸匕日二不知增之至二匕大劇可至再服酒隨飲多少忌海藻松菜生葱等

又療久欬逆上氣體腫氣脹滿晝夜倚壁不得卧喉常作水雞鳴白前湯方 白前兩紫苑 半夏洗

三 兩大戟切七 右四味切先以水一斗漬之一宿明旦煮取三升分三服忌羊肉錫此四方味千金方見水腫欬上氣中

千金古今錄驗同

小品療欬逆喉中如水雞聲貝母湯方 貝母 甘草炙各二兩 麻黃去節桂心各四兩 半夏洗 乾薑內各三 杏仁七

枚 右七味切以水二斗三升先煮麻黃得十沸內藥煮取三升溫服七合日三忌海藻松菜生葱羊

肉錫古今錄驗同

又療欬而上氣咽中如水雞聲射干麻黃湯方 射干十二枚 麻黃去節生薑各四兩 紫苑 款冬花 細辛各

兩 五味子半 半夏洗 大棗七枚 右九味切以東流水一斗二升煮取三升分三服忌羊肉錫生菜本

仲景傷寒論方千金古今錄驗同並出第一卷中

必效療病喘息氣急喉中如水雞聲者無問年月遠近方 肥皂莢兩 好酥兩 右二味於火上炙去火

高一尺許以酥細塗之數翻覆令得所酥盡止以刀輕刮去黑皮然後破之去子皮筋脈搗篩蜜和

為丸每日食後服一丸如熟豆日一服訖取一行微利如不利時細細量加以微利為度日止一服忌

如藥法出第一卷中

今古錄驗沃雲湯療上氣不得息卧喉中如水雞聲氣欲絕方 麻黃四兩 細辛兩 五味子半 桂心 乾

薑各一兩 右六味切以水一斗煮取三升絞去滓適寒溫服一升投杯則卧一名投

杯麻黃湯令人汗出不得卧勿怪亦可從五合不知稍增日再凡煮麻黃先煎二沸去上沫又內餘藥

忌生葱生菜羊肉錫集驗經心錄范注同

又投杯湯療久欬嗽上氣胸中寒冷不得息食卧不安席每牽繩而起咽中如水雞聲方 款冬花四十

細辛一兩 紫苑三兩 甘草 桂心 麻黃去節 乾薑各二兩 五味子半 杏仁四十枚 半夏洗 右十味切以水八

升者取二分分再服卧汗出即愈忌海藻松菜生葱生菜羊肉錫並出第九卷中

因食飲水上氣方四首

古今錄驗宮泰說李將軍見得病喘息甚難并數上氣呼吸療之不差遂亡本由食餅後乃飲水得之服五味湯不差此輩皆死是後乃有得得之行極而渴飲水多此為所發起同與五味湯亦不差然後小差泰因此與三物備急藥半錢吐下得差由此思惟病之所由以冷水入肺及入腸寒熱不消化結聚逼迫於胃口故令其呼吸乏氣息不得下過謂喘而上氣息數也宜吐下之亦可與三物瓜蒂散吐之

三味備急散本療卒死感忤宮泰以療人卒上氣呼吸氣不得下喘逆差後已為常用方 巴豆 乾薑

大黃 右藥等分巴豆小熬去心皮合搗下篩服半錢已得吐下則愈忌野豬肉蘆笋並注

又三味吐散宮泰以療上氣呼吸喘逆方 瓜蒂 杜衡各三人參分 右藥搗篩為散以溫湯服一錢

已老小半之並注同並出第十九卷中

時後療大走馬奔走喘乏便飲冷水冷飲因得上氣發熱方 竹葉三斤橘皮切三兩 右二味以水一斗半

煮取三升去滓分為三服三日服一劑良集驗用竹葉三兩並注等同

又方 葶藶子一兩乾薑四十兩 右二味以水三升先煮葶藶取一升內葶藶子煎取五合大人分一二服

小兒分三四服並出第一卷中

卒短氣方四首

肘後卒短氣方 搗韭取汁服一升立愈文仲備急千金同出第一卷中

千金療卒短氣方 枸杞葉 生薑切各二兩 右二味以水三升煮取一升頓服之

又方 生薑切五兩小麥升 右二味以水七升煮取一升頓服之

又方 紫蘇葉切一升大棗二升 右二味以酒三升煮取一升半分再服水亦得又方加橘皮半兩並出

第十七卷中

尚德按時後云治卒上氣喘急尚德按千金云治之氣方尚德按此二方千金云下氣方又按千金小麥二升

上氣及氣逆急牽繩不得卧方八首

廣濟療肺氣痰上氣急及欬方 柴胡^{兩五} 五味子 橘皮 紫苑 貝母 杏仁^{各三} 麻黃^{去節} 甘草^炙

前^{各二} 右九味細切搗令極碎每服取麥門冬一兩去心生薑半兩切竹葉一兩半以水二升五

合先煮麥門冬生薑竹葉有一升五合內散二兩煎取一升二合絞去滓分二服平旦空肚服之一服

日晚食消後服之每日作一劑忌油麪猪犬肉小豆粘滑酸鹹海藻^{出第三} 藻菜^{卷中}

肘後療欬上氣喘息便欬絕方 未人參服之方寸匕日五六^{出第一}

深師療上氣及諸逆氣神驗白前湯方 白前^{兩五} 紫苑 杏仁 厚朴^炙 各半 夏^洗 麻黃^{去節} 各生薑^{一斤}

八^{方用} 人參 桂心^{各二} 甘草^炙 大棗^{枚十} 右十一味切以水八升煮取二升半分三服良忌海

藻^{藻菜} 羊肉生蔥^湯

又療肺氣不足欬嗽上氣牽繩而坐吐沫唾血不能食飲補肺溢湯方 蘇子^升 桑白皮^{五兩} 夏^{六兩} 紫

苑 人參 甘草^炙 麻黃^{去節} 五味子 乾薑 杏仁^{各一} 細辛^{半兩} 桂心^{兩三} 款冬花^{射干} 各一

右十四味切以水一斗二升煮取三升分五服日三夜再忌海藻^{藻菜} 羊肉^同 錫生蔥^{生菜} 半夏

又療諸欬病上氣胸滿晝夜不得卧困篤鍾乳丸方 鍾乳^{八分} 乾薑^{六分} 款冬花 細辛 桑白皮 半夏

四分^洗 貝母 附子^{五分} 蜀椒^{三分} 芎藭^{四分} 紫苑^{八分} 杏仁^{三分} 右十二味搗篩蜜和服如大豆二九日三

忌冷食^{出第十} 猪肉^{八卷中} 錫生菜

千金療上氣不得卧神祕方 橘皮 生薑 紫蘇 人參 五味子^{各三} 右五味切以水七升煮取

三升分三服^{一方有桔梗無五味}

古今錄驗療積病後暴上氣困篤投杯湯方 石膏^{兩四} 甘草^{二兩} 五味子^{三兩} 大棗^{二十} 人參 桂心

半夏^洗 杏仁^{各二} 麻黃^{去節} 生薑^{兩四} 右十味切以水一斗煮取三升一服六合日三夜一忌羊肉^錫

海藻^{藻菜} 生葱^等

尚德按三
千金作五

尚德按去
字下錢有
脫字

又療上氣呼吸牽繩肩息欲死覆杯湯方 麻黃四兩甘草吳乾薑桂心 貝母各二兩 右五味切以

水八升煮取二升分再服則愈有人先有風患兼有石熱取冷當風飲酒房室體虛未春因天行病至

夏中差尚虛有風熱未除東藥石勢過傷於胃氣因腹脹堅如石氣息不利因自下後變四肢腫遊走

無定小便不通積服利藥忽吐逆不下食變嗽至掣動百脈狀如噓喘積日乃變上氣服此方加杏仁

二兩與兩劑上氣得止忌海藻生菜菰菜范汪經心錄同

欬嗽上氣方七首

病源欬嗽上氣者肺氣有餘也肺感於寒微則成欬嗽肺主氣氣有餘則喘欬上氣此為邪搏於氣氣擁

滯不得宣發是為有餘故欬嗽而上氣也其狀喘欬上氣多涕唾面目浮腫則氣逆也出第十卷中

深師療上氣欬嗽蘇子煎方 蘇子 生薑汁 白蜜 生地黃汁 杏仁各二 右五味搗蘇子以地黃薑

汁澆之絹紋取汁更搗以汁澆復按如此六七過令味盡去滓熬杏仁令黃黑搗令如脂又以向汁澆

之絹紋取汁往來六七過令味盡去滓內蜜和置銅器中於重陽中煎之令如飴煎成一服方寸七日

三夜一忌無美千金

又療欬嗽上氣射干煎方 射干八兩紫莞半兩膠飴五兩細辛半兩乾薑五兩生竹瀝升芫花根半兩桑根白皮

款冬花各八兩附子炮甘草炙各半兩白蜜一升 右十二味先切射干合蜜竹瀝汁煎五六沸絞去滓收咀

諸藥以水一升四合清一宿煎之七上七下去滓乃合飴薑末煎令如餠服酸棗一丸許日三夜一不

知稍增之忌海藻松菜猪肉冷水生菜千金

又療欬上氣中寒冷鼻中不利杏仁煎方 杏仁五兩五味子三兩甘草炙四兩麻黃去節款冬花三兩紫莞 乾

薑各三兩桂心四兩 右八味切以水一斗煮麻黃減二升掠去沫乃內諸藥煮取四升絞去滓又內膠飴

半斤白蜜一斤令內汁中攪令相得湯中煎如飴成先食服如半棗日三不知稍加之忌海藻松菜生

尚德按千金無羌活根

尚德按癰病源作癰

慈千金同出第

崔氏療上氣暴效方

紫蘇二升

大豆一升

右二味以水四升煮大豆次下紫蘇煮取一升五合分為三

服晝二夜一忌

醋酢鹹酸油膩等出第六卷中

必效主上氣腹脹心胸滿并效不能食方

段明府云極效

枇杷葉一握去毛炙

生薑二兩良薑二兩蜜酥

各二

右六味切以水二大升煮取一大升湯成後內酥蜜更煮三五沸分溫三服每服如人行八九

里久甚重者三兩劑任意食之

出第一卷中

救急療上氣效肺氣胸痛方

杏仁三大升

白蜜一大升

牛酥二大升

右三味杏仁搗碎於瓷盆中研取汁五

升淨磨銅鐺勿令脂膩先傾三升汁於鐺中刻木記其深淺又傾二升汁以緩火煎減至於所記處即

內白蜜及酥還至木記處藥乃成貼不津瓷器中每日三度以煖酒服一大匙不能飲酒和粥服亦得

服一七日唾色變白二七日唾稀三七日效斷此方非但療效兼補虛損去風冷兼悅肌膚白如皃婦

人服之更佳

延年秘錄同出第六卷中

古今錄驗療上氣兼效蘇子湯方

蘇子升五五味子升五麻黃升五細辛升五

紫苑

黃芩

甘草二兩

人參

桂心

當歸各一升夏一升生薑五兩

右十二味切以水九升煮取三升分二服上氣病亦特單煮蘇

子及生蘇葉冬天者乾枝葉亦佳忌海藻松菜羊肉錫生葱生菜

出第十卷中

效逆上氣嘔吐方四首

病源五臟皆稟氣於肺肺感微寒則成效嗽也寒搏於氣氣聚還肺而邪有動息邪動則氣奔逆上氣上

則五臟傷動動於胃氣者則胃氣逆而嘔吐也此是肺效連滯氣動於胃而嘔吐者也又有春夏脾王之

時而脾氣虛不能王有寒氣傷之而效嗽者謂之脾效其狀效則右脇下痛陰陰引膊背甚則不可動動

則效發脾與胃合脾效不已則胃受之其狀效嗽而嘔嘔甚則長蟲出是也凡諸效嗽甚則嘔吐各隨證

候知其肺臟也

出第十卷中

深師療效嗽上氣喉咽中腥臭虛氣攪心頭痛眼疼耳中嘈嘈風邪毒注天行食不生肌胸中隔塞嘔逆

多唾惡心心下堅滿飲多食少瘡瘰并淋通氣丸方 膠飴斤五 蜀椒斤二 烏頭七分 桂心六分 大附子五枚

乾薑人參各四分 杏仁升一 天門冬分十 蜈蚣五節去頭炙 右十味末之搗杏仁作膏稍稍內藥末搗千過

膠飴乃內藥中攪令調和合如半棗一枚日六七夜二三服令胸中溫為度若夢與鬼神交通及飲食

者全用蜈蚣食不消者加杏仁五合有虛氣少腹急腰痛加天門冬杜仲有風加烏頭二枚附子一枚

立夏後勿加也有留飲加草薤子一兩煮末之忌猪肉冷水生葱鯉魚等物千金

又療上氣欬逆口乾手足寒心煩滿積聚下利嘔逆若墜瘀血上氣胸脇脹滿少氣腸鳴飽食傷中裏急

婦人乳飲滯下有邪濕陰不足大小便不利肢節骨痛硝石丸方 硝石升 乾薑前胡 大黃各一杏

仁升 右五味搗篩蜜和飲服如梧子三九日再五日後心腹諸疾隨大小便去月經絕則通下長蟲

數十亦利血及冷熱赤白汁癰疽毒悉主之藥利以意消息

又療上氣煩悶嘔逆不得飲食厚朴湯方 厚朴炙人參各一 半夏四兩 生薑八兩 茯苓甘草 橘皮

桂心枳實各二兩 右九味切以水八升煮取三升分三服忌海藻松菜羊肉錫生葱醋物並出第十

必效療上氣欬嗽嘔逆不下食氣上方 橘皮紫苑各三 人參茯苓 柴胡杏仁 右六味

切以水六升煮取二升分三服患冷加生薑二兩患熱加麥門冬三兩去心不能食加白朮二兩厚

朴二兩是忌醋物桃李雀肉等出第一卷中

上氣欬嗽多唾方三首

廣濟療上氣肺熱欬嗽多涕唾方 白前四分 生麥門冬十分 貝母石膏 甘草炙 五味子生薑各四

黃芩分五 杏仁四十 淡竹葉升一 白蜜一 右十一味切以水七升煮取二升七合絞去滓內白蜜更上

火煎三沸分溫三服每服如人行五六里須利三兩行湯成後宜加芒硝八分忌熱飯炙肉油膩醋食

海藻松菜出第二卷中

古今錄驗小紫苑丸療上氣欬逆多唾方 乾薑甘皮 甘草一作細辛 款冬花紫苑各二 附子二枚

尚德接天
醫以下十
六字致當
大書

右六味搗篩以蜜和為丸如梧子先食服三丸日再以知為度忌冷水豬肉生菜等物

又療欬氣上多涕唾杏仁煎方出徐杏仁升右一味搗碎研取大升三升汁以水和研之前取一大

升酒服一匙日三忌豬雞魚肉胡荽等物並出第十卷中

上氣欬方一首

古今錄驗療欬逆上氣胸滿多唾太醫令王叔和所撰乾薑三分磨石一分泥曼蜀椒五分細辛二分烏頭

一分地杏仁一分吳茱萸洗四薑黃一分紫苑一分延一分去款冬花三分麻黃四分右十二味搗篩蜜和

丸如梧子夜卧吞一丸日二不知加之療二十年欬不過二十丸便愈御藥也祕在石室不傳忌猪羊

肉錫生菜冷水一方有桂心三分麻黃千金同出第十九卷中

久欬嗽上氣方三首

肘後療久欬上氣十年二十年諸藥療不差者方 續腴三乾薑一百右二味以酒三升漬數日服二

三合至四五服愈服盡此則差千金同出第三卷中

深師療久上氣欬麻黃散方司馬大傳欬麻黃一斤杏仁一百甘草二兩桂心一兩右四味搗篩別搗杏

仁如脂內諸末合令調臨氣上發時服方寸匕氣下止食頃氣不下更服一匕可至三匕氣發便服即

止忌海藻松菜生葱錄千金古今

又療久上氣欬亦療傷寒後欬嗽方 甘草二兩大棗二十右二味以水七升煮取二升分再服數用

驗忌海藻松菜等古今錄驗名溫牌

欬逆上氣方五首

病源師虛感微寒而成欬欬而氣還聚於肺肺則脹是為欬逆也邪氣與正氣相搏正氣不得宣通但逆

上喉咽之間邪伏則氣靜邪動則氣奔上煩悶欬絕故謂之欬逆上氣出第十卷中

深師療欬逆上氣支滿息欲絕氣結於胸中心煩躁不安一合湯方 芫花二分桂心 乾薑各五分甘草

又細辛各四分 薤花分 右六味切以水三升煮取一升先食服一合日三夜一又云合湯亦得分六七

服一日晝便愈一方有葛蒲四分無薤花忌海藻松菜生葱生菜等

又癰欬逆上氣腹中有堅痞往來寒熱令人羸瘦不能飲食或時下痢此腹中如絞在臍上下關氣上

腸使然為病有氣涌逆薊椒散方 蜀椒五合去目并桂心 甘草各一兩 通草半斤 右五味搗

篩飲服方寸匕日三夜一忌海藻松菜羊肉錫生葱並此第十

古今錄驗麥門冬丸主氣逆上氣方 乾薑各一分 麥門冬十分 昆布洗 海藻洗各細辛 海蛤煮桂

心各四分 右八味搗篩蜜和丸如梧子以飲服十丸漸加至二十丸日三有人患風虛得冷輒胸中上

氣喉中常如吹管聲欬嗽唾沫將此丸服得差若散服方寸匕日三忌生葱生菜經心

又鯉魚湯療欬逆上氣喉中不利方 生鯉魚一熟艾升白蜜升紫苑 牡蠣各四兩 款冬花升杏仁 二十

豉升射干 二兩 細辛三兩 薑二兩 右十二味以明藥和內魚腹中貫銅器中蒸之五斗米飯下藥成

服一升日三夜一忌生菜羊肉錫等

又杏仁煎療欬逆上氣方 杏仁升石解 乾薑各四分 桂心 甘草又麻黃 五味子 欬冬花

紫苑各三兩 右九味搗八味下篩以水一斗先煮麻黃取八升去滓內藥末膠飴半斤蜜一斤攪令相

得未食服如棗大一枚日三忌生菜海藻松菜等並此第二十九卷中

雜療上氣欬嗽方四首

廣濟療上氣欬嗽兼水氣癖氣方 葶藶子煮 貝母 桂梗 龍甲炙 防葵各六分 白朮 茯苓 大戟

枳實炙 紫苑 旋覆花 杏仁 橘皮各四分 芫花二分 大黃一分 皂莢一分 右十六味搗篩蜜和為丸

空腹以飲服如梧子五丸日二服漸漸加至十丸以微利為度忌桃李雀肉苋菜醋物猪肉陳臭等並此

中卷

深師療上氣搶心胸奄奄不得息腹中脹滿食振吐蘇子湯方 蘇子升 大棗三十 半夏洗 橘皮 生

薑 桂心各一兩 蜀椒二分

右七味以水七升煮取二升分三服忌羊肉錫生葱出第十卷中

古今錄驗半夏湯療上氣五臟閉塞不得飲食胸中脇下支脹乍去乍來虛氣結於心中伏氣住胃管唇乾口燥肢體動搖手足疼冷夢寐若見人怖懼此五臟虛乏諸勞氣不足所致并療婦人方當歸防風

黃耆各二兩 柴胡半斤 細辛 麻黃去節 人參各一兩 杏仁五十粒 桂心二兩 半夏洗一升 大棗二十枚 生薑五兩 黃芩一兩

右十三味切以水一斗先煮麻黃一沸去上沫更入水一升及諸藥煮取五升分為五服日三夜二忌


羊肉生葱生菜錫等並出第十卷中

近效療上氣腹內脹滿飲食不消欲作霍亂及欬嗽紫蘇子丸方 紫蘇子 橘皮各二兩 高良薑 桂

心 人參各一兩 右五味搗篩蜜和為丸每服十五丸飲酒任下若食瓜膾等物有生熟氣擬似霍亂

者即半棗栗許大細細嚙取汁令消盡應時立愈常有此藥水不患霍亂甚神效也忌生葱猪肉陳臭

等物



W 2467. w

1915

V. 8-10